APTE.PL A.T.HINZ S.J.
ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

Amertil Bio 10mg x10 tabletek

Cena: 10,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Biofarm
Postać	tabletki
Substancja czynna	cetyryzyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Skład

Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego Amertil Bio zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze: jedna tabletka powlekana zawiera 80,62 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

- cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
- cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na cetyryzyny dichlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

- Jedna tabletka powlekana (10 mg) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat

- ½ tabletki powlekanej (5 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Osoby w podeszłym wieku

- Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

- Brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ cetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki, w przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek.
- U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

- Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz z zaburzeniami czynności wątroby

- Zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej: „Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek”).