

Carbo medicinalis VP 300mg x20 tabletek

Cena: 17,50 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Bausch Health
Postać	tabletki
Substancja czynna	węgiel leczniczy
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu

Carbo medicinalis VP to produkt leczniczy w formie tabletki stosowany w leczeniu biegunek, niestrawności i wzdęć oraz w zatruciach lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

- Skuteczne leczenie: Carbo medicinalis VP to produkt leczniczy - dawki substancji leczniczych są ściśle określone w badaniach klinicznych, co gwarantuje skuteczne i bezpieczne leczenie.
- Bezpieczeństwo stosowania: węgiel aktywny ma dobry profil bezpieczeństwa i w leczeniu zatruc, pod kontrolą lekarza, może być stosowany nawet u dzieci poniżej 1. roku życia.
- Wygoda stosowania:
 - Carbo medicinalis VP zawiera 300 mg węgla w 1 tabletko czyli największą dawkę na rynku. Dzięki tak dużej dawce węgla w 1 tabletko pacjent przyjmuje mniejszą ilość tabletek w przebiegu całej terapii, co jest wygodniejsze.
 - Tabletki można połykać w całości lub rozgryzać. Można też je rozkruszyć i po wymieszaniu z wodą spożyć w postaci zawiesiny, przyspieszając w ten sposób działanie węgla.

Co to jest Carbo medicinalis VP – skład i postać:

- Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna tabletko zawiera 300 mg węgla aktywnego.
- Pozostałe składniki to: sacharoza, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerol, magnezu stearynian.
- Postać farmaceutyczna: tabletki.

Dawkowanie – jak stosować lek Carbo medicinalis VP?

Biegunki:

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
 - Jednorazowo doustnie około 4,0 g (10 do 13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek

wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

Niestrawność i wzdęcia:

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
 - Doustnie, przeciętnie 3 do 4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:

- Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:
 - Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (41 do 42 tabletek). W razie potrzeby można ją podawać kilkakrotnie w ciągu doby.
- Dzieci poniżej 1 roku:
 - Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg masy ciała. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 – 6 godzin.
- Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby:
 - Bez zmian dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carbo medicinalis VP

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Carbo medicinalis VP może dojść do zaparcia. Lek nie wchłania się jednak z przewodu pokarmowego i nie wywołuje ogólnoustrojowych objawów zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Carbo medicinalis VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carbo medicinalis VP

W przypadku przerwania stosowania leku Carbo medicinalis VP może dojść do nasilenia objawów, z których powodu jest stosowany. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Carbo medicinalis VP przeciwwskazania – kiedy nie stosować?

- Jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli pacjent jest nieprzytomny a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lub jeśli wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może to wskazywać, że leczenie wyłącznie węglem aktywnym jest niewystarczające.
- Gdy zatrucie wywołane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub prowadzące do drgawek, ponieważ w przypadku zatrucia takimi lekami, podobnie jak u osób nieprzytomnych, istnieje zagrożenie aspiracji do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc); w takich sytuacjach przed zastosowaniem płukania żołądka lekarz powinien najpierw przeprowadzić intubację.
- Jeśli lek Carbo medicinalis VP stosuje się w zatruciu środkami wpływającymi na perystaltykę jelit.

Carbo medicinalis VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków. W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Carbo medicinalis VP z jedzeniem i piciem

Leku Carbo medicinalis VP nie należy przyjmować podczas, ani bezpośrednio po posiłkach, ponieważ pokarm zmniejsza zdolność adsorpcyjną węgla aktywnego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Carbo medicinalis VP zawiera sacharozę

Każda tabletką zawiera 253,5 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

- Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, zwłaszcza u dzieci, zaparcia.
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: aspiracja do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc), zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla.
- Węgiel barwi stolec na czarno.

Podmiot odpowiedzialny:

- Bausch Health Ireland Limited
- 3013 Lake Drive
- Citywest Business Campus
- Dublin 24, D24PPT3
- Irlandia

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Galeria



Naturalne rozwiązanie na naturalny problem!

• biegunka • niestrawność • wzdęcia

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi*
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia



Jak wygodnie przyjąć zalecaną porcję węgla?

połknąć tabletki w całości lub rozgryźć tabletkę i połknąć lub rozkruszyć tabletkę, wymieszać z wodą i wypić zawiesinę



Zapewnia*:

- Wielokierunkowe działanie
- Wygodne stosowanie
- Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących*

Ciepło i niebezpieczna stosuj go zgodnie z dawką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

*Ocena skuteczności i bezpieczeństwa w oparciu o dane z badań klinicznych. Wykazano, że CARBO MEDICINALIS VP jest skuteczny i bezpieczny w stosowaniu u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Ciepło i niebezpieczna stosuj go zgodnie z dawką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

*Ocena skuteczności i bezpieczeństwa w oparciu o dane z badań klinicznych. Wykazano, że CARBO MEDICINALIS VP jest skuteczny i bezpieczny w stosowaniu u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Ciepło i niebezpieczna stosuj go zgodnie z dawką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciepło i niebezpieczna stosuj go zgodnie z dawką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Węgiel aktywny jest również dostępny w formie kapsułek



WĘGIEL LE CZNICZY VP
produkt leczniczy w postaci kapsułek zawierający 200 mg węgla aktywnego

Ciepło i niebezpieczna stosuj go zgodnie z dawką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.