

Debutir Forte x60 kapsułek

Cena: 37,39 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	60 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	kapsułki
Substancja czynna	maślan sodu
Typ produktu	dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Wiek	dorośli, dzieci, od 7 roku życia

Opis produktu

DEBUTIR FORTE zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu o innowacyjnych właściwościach. Mikrogranulat umożliwia uwalnianie kwasu masłowego wzdłuż całego przewodu pokarmowego, a szczególnie w jelitach.

Kwas masłowy jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka jelit.

Zastosowanie nowoczesnej technologii mikrogranulacji, w przeciwieństwie do standardowych form kwasu masłowego, zabezpiecza go przed całkowitym wykorzystaniem w górnym odcinku przewodu pokarmowego i pozwala na dostarczenie kwasu masłowego do jelita cienkiego oraz grubego. Skład mikrogranulek jest odpowiednio dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej długości jelita cienkiego i grubego.

Wskazania:

DEBUTIR FORTE przeznaczony jest do postępowania dietetycznego:

- w zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego),
- w chorobach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit (m.in. nieswoiste choroby zapalne jelit, biegunki różnego pochodzenia),
- w zaburzeniach flory jelitowej,
- w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (np. niedostateczna podaż błonnika),
- u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in. w stanach zapalnych jelit po radioterapii),
- w zakażeniach jelit i bieguncie (m.in. po antybiotykoterapii).

Dawkowanie:

- Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3

miesiący.

- Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. - Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.
- Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

Skład:

- Jedna kapsułka preparatu Debutir Forte 300 mg maślanu sodu.