

Axoviral krem 50mg/g 10g

Cena: 10,46 PLN



Opis słownikowy

Miejsce stosowania	twarz, szyja
Opakowanie	10g
Podmiot odpowiedzialny	Aristo Pharma
Postać	krem
Przeznaczenie	pielęgnacja
Substancja czynna	acyklowir
Typ produktu	produkt leczniczy

Opis produktu

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Axoviral krem 0,05 g/g wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy przywołanej przez wirusa opryszczki Herpes simplex.

Działanie:

Substancją czynną w leku Axoviral jest acyklowir, który wykazuje działanie przeciwwirusowe, zwłaszcza w kierunku wirusa opryszczki pospolitej. Produkt leczniczy w postaci kremu służy do stosowania miejscowego bezpośrednio na zmianę skórą.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występuje obniżona odporność lub pacjent stosuje leki, które mogą powodować osłabienie odporności.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na acyklowir, walacyklowir lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować

na błony śluzowe.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek Axoviral krem 0,05 g/g może wywołać działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku reakcji uczuleniowej z objawami takimi jak obrzęk twarzy, ust, języka, trudności w oddychaniu. Niezbyt często występują: łagodne wysuszenie lub złuszczenie się skóry, przemijające uczucie pieczenia, mrowienia lub kłucia (zwykle bezpośrednio po nałożeniu kremu), swędzenie. Rzadko występują: rumień, kontaktowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko występują: nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym: ciężkie, włącznie z obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką.

Dawkowanie:

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Lek stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie z ulotką. Przed aplikacją kremu i po niej dokładnie umyć ręce. Krem aplikować na zmianę chorobową na skórze 5 razy dziennie, zachowując około czterogodzinne odstępy czasowe. Zachować przerwę nocną. Najlepiej rozpocząć nakładanie kremu zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów (pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie). Stosować co najmniej 4 dni, maksymalnie 10 dni. Jeśli doszło do pogorszenia objawów lub nie ustąpiły one po 10 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład:

Substancja czynna: acyklowir; 1g kremu zawiera 50mg acyklowiru. Pozostałe składniki: alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy, sodu laurylosiarczan, poloksamer 407, wazelina biała, woda oczyszczona.