

## Betadine 10% maść 20g



Cena: 19,62 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	20g
Podmiot odpowiedzialny	Egis
Postać	maść
Substancja czynna	jodowany powidon
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 2 roku życia

### Opis produktu

#### Co to jest lek Betadine i w jakim celu się go stosuje

Lek Betadine, 100 mg /g, maść jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Substancja czynna leku powidon jodowany to połączenie jodu i polimeru poliwinylpyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po zastosowaniu leku Betadine uwalnia się jod. Wolny jod ma silne właściwości bakteriobójcze - działa na wirusy, grzyby, a także niektóre pierwotniaki. Lek Betadine jest środkiem dezynfekującym.

Lek Betadine stosuje się w miejscowym leczeniu oparzeń, ran, otarć, owrzodzeń troficznych, zakażeń skóry.

#### Kiedy nie stosować leku Betadine

- jeśli pacjent ma uczulenie na powidon jodowany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 ulotki);
- jeśli występują zaburzenia tarczycy;
- przed lub w trakcie scyntygrafii radiojodem (badanie, w którym podaje się radioaktywny jod) lub leczenia raka tarczycy radiojodem; Po scyntyigrafii lub leczeniu raka tarczycy radiojodem należy zachować odpowiedni odstęp czasowy (co najmniej 1-2 tygodnie) między tymi procedurami, a ekspozycją na powidon jodowany (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
- jeśli u pacjenta występuje opryszczkowe zapalenie skóry (zwane opryszczkowym zapaleniem skóry Duhringa);
- z produktami zawierającymi rtęć, ponieważ jednoczesne stosowanie może uszkadzać skórę;
- nie stosować u dzieci do 1. roku życia.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Betadine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry (wysypkę uczuleniową lub podrażnienie skóry wywołane przez kontakt z alergenem), a w rzadkich przypadkach ciężkie reakcje skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcje uczuleniowe, należy zaprzestać stosowania leku.
- Nie należy nagrzewać skóry przed nałożeniem leku.
- Pacjenci z niewydolnością nerek powinni zachować szczególną ostrożność.
- Należy unikać kontaktu leku Betadine z oczami. Jeśli to się zdarzy, pomimo wszelkich środków ostrożności, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.
- Po zastosowaniu tego leku należy dokładnie umyć ręce.
- Unikać kontaktu z biżuterią, szczególnie zawierającą srebro.

#### Dzieci i młodzież

- Leku Betadine nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.
- Lek Betadine nie jest zalecany dla dzieci w wieku do dwóch lat.

### Jak stosować lek Betadine

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Maść Betadine jest przeznaczona do stosowania wyłącznie na skórę.
- Nałożyć porcję maści wielkości ziarna grochu (1 ziarno grochu = 1 cm<sup>2</sup> = 100 mg) na zmienioną skórę w miarę potrzeby, jeden lub dwa razy na dobę, nie dłużej niż przez 7 dni.
- Jeśli stan skóry nie poprawi się w ciągu 7 dni albo gdy po leczeniu zakażenia nastąpi nawrót (zaczerwienienie, ból, obrzęk, ropna wydzielina), należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować maści Betadine powyżej 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

#### Dorośli

- Nałożyć porcję maści wielkości 8-9 ziaren grochu raz na dobę, albo porcję wielkości 4,5 ziarna grochu dwa razy na dobę na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię skóry w leczonym obszarze.

#### Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 2-18 lat):

- Maść Betadine nie jest zalecana u dzieci w wieku poniżej 2 lat i nie wolno jej stosować u niemowląt do pierwszego roku życia (patrz punkt „Kiedy nie stosować maści Betadine”).
- U dzieci w wieku 2-5 lat nakładać ilość nie większą od ziarna grochu na dobę.
- U dzieci w wieku 6-8 lat nakładać ilość nie większą od 2 ziaren grochu na dobę (albo ilość 1 ziarna grochu dwa razy na dobę).
- U dzieci w wieku 9-13 lat nakładać ilość nie większą od 3 ziaren grochu na dobę (lub 1,5 ziarna grochu 2 razy na dobę).
- U dzieci w wieku 14-18 lat nakładać ilość nie większą od 5 ziaren grochu na dobę (lub 2,5 ziarna grochu 2 razy na dobę).

Ranę można pokryć opatrunkiem lub bandażem, w zależności od rozległości i ciężkości uszkodzenia. Nie stosować w okolicy oczu.

### Co zawiera lek Betadine

- Substancja czynna jest powidon jodowany. Każdy gram maści zawiera 100 mg powidonu jodowanego.
- Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, makrogl 400, makrogl 4000, makrogl 1000, makrogl 1500, woda oczyszczona.