


## Betadine 10% płyn na skórę 30ml



Cena: 17,72 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	30ml
Podmiot odpowiedzialny	Egis
Postać	płyn
Substancja czynna	jodowany powidon
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 miesiąca życia

### Opis produktu

Betadine roztwór na skórę jest środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom przeznaczonym do dezynfekcji skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją, dezynfekcja skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi, aseptycznego zaopatrzenia ran, leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych, całkowitej i częściowej dezynfekcji pacjenta przed operacją (kąpiel antyseptyczna).

### Wskazania:

Do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, aseptycznego zaopatrzenia ran, leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych.

### Dawkowanie:

Zewnętrznie. Do odkażania nieuszkodzonej skóry roztwór 10% nanosi się na 1-2 minuty. Do przemywania błon śluzowych i ran stosuje się roztwór 10% lub 7,5%. Do kąpieli odkażającej rozcieńcza się płyn i 1 % roztwór nanosi się na skórę i spłukuje wodą po upływie 2 minut. Roztwór preparatu rozcieńcza się tuż przed jego zastosowaniem. Nie należy przechowywać rozcieńczonego roztworu.

### Dzieci i młodzież

U noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia lek można stosować wyłącznie wtedy gdy zdecyduje o tym lekarz w przypadku potwierdzonego rozpoznania i ścisłych wskazań do stosowania jodowanego powidonu. Należy monitorować czynność tarczycy.

Noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia są zagrożone rozwojem niedoczynności tarczycy po podaniu dużych ilości jodu. Dlatego u noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia stosowanie tego leku powinno być ograniczone do bezwzględniego minimum, z uwagi na znaczne przenikanie leku przez skórę do organizmu i zwiększoną wrażliwość na jod.

Należy bezwzględnie chronić dziecko przed poknięciem leku.

**Skład:**

1 ml roztworu zawiera 100 mg powidonu jodowanego oraz substancje pomocnicze: glicerol, nonoxynol 9, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan bezwodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

**Przeciwwskazania:**

Uczulenie na jod lub inny składnik preparatu, rozpoznana nadczynność tarczycy lub innych chorób tarczyc, łagodny guz tarczycy, opryszczkowe zapalenie skóry, niewydolność nerek, przed i po leczeniu nadczynności tarczycy jodem radioaktywnym.