

Cevitt Gardło o smaku cytrynowym x20 tabletek do ssania

Cena: 25,33 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Alpen Pharma
Postać	tabletki do ssania
Substancja czynna	cynk, witamina C
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Cevitt Gardło tabletki do ssania z kwasem hialuronowym.

- Łagodzi i nawilża
- Regeneruje
- Chroni

Cevitt Gardło dzięki unikatowemu połączeniu hialuronianu sodu, ksantanu i karbomeru wykazuje potrójny mechanizm działania. Na powierzchni podrażnionej błony śluzowej jamy ustnej i gardła tworzy się hydrożelowy kompleks – powłoka ochronna, który szczelnie otula gardło. Dzięki temu błona śluzowa zostaje długotrwale nawilżona i ma czas, aby się zregenerować.

Hydrożelowy kompleks łagodzi również najbardziej uporczywe objawy takie jak:

- nadmierna suchość błony śluzowej gardła
- pieczenie i drapanie w gardle
- chrypka
- kaszel
- trudności z połykaniem

Cevitt Gardło zawiera również witaminę C i cynk, które wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego.

Cevitt Gardło zawiera:

hialuronian sodu, ksantan, karbomer, mannitol, sorbitol, wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, aromat, aspartam, witamina C, dwuwodny cytrynian cynku. Dzięki obecności substancji pomocniczych witaminy C i dwuwodnego cytrynianu cynku 1 tabletki Cevitt Gardło zawiera 1,5 mg cynku i 12,00 mg witaminy C. Zawiera aspartam i sorbitol.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat:

- należy powoli ssać 1 tabletkę co 4-5 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia:

- należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

Tabletek Cevitt Gardło nie powinno się rozgryzać ani w całości połykać.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem preparatu.

Przeciwwskazania:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik preparatu,
- W przypadku znacząco ograniczonego wytwarzania śliny, np. w przypadku syndromu Sjogrena,
- Jeśli pacjent choruje na fenylketonurię, ze względu na to, że tabletki zawierają aspartam stanowiący źródło fenylalaniny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Cevitt Gardło zawiera sorbitol. Jeśli pacjent nie toleruje określonych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane:

W przypadku nadmiernego stosowania tabletek do ssania Cevitt Gardło może ono prowadzić do rozrzedzenia się stolca i działać przeczyszczająco.

Skład:

1 tabletkę zawiera:

- 1,5 mg (15%)* cynku oraz 12 mg (15%)* witaminy C.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia