

# Chlorchinaldin VP 2mg o smaku czarnej porzeczki x40 tabletek do ssania

Cena: 25,57 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	40 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Valeant
Postać	tabletki do ssania
Substancja czynna	chlorchinaldolum
Typ produktu	produkt leczniczy

## Opis produktu

### SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletkę do ssania zawiera 2 mg chlorchinaldolu (Chlorquinaldolum).

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

### DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Co 1-2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg chlorchinaldolu (tj. 10 tabletek do ssania) na dobę. Nie rozgryzać tabletek. Nie stosować podczas posiłku.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Galeria



**ZASTOSUJ NA INFEKCJĘ GARDŁA**  
Lek antyseptyczny na infekcje jamy ustnej i gardła\*

**40 TABLETEK DO SSANIA**

\*To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Chlorchinaldin

LEK ANTysePTYCZNY  
NA INFEKCJĘ JAMY USTNEJ  
I GARDŁA

DZIAŁA MIEJSCOWO  
PRZECIWBAKTERYJNIE  
WSKAZANY  
W LECZENIU GRZYBICY  
POANTYBIOTYKOWEJ\*

\*To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Chlorchinaldin

Chlorchinaldin działa  
na bakterię *streptococcus pyogenes*,  
która jest przyczyną



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Chlorchinaldin**  
ZASTOSUJ NA INFEKCJĘ GARDŁA  
Lek antyseptyczny na infekcje jamy ustnej i gardła\*



\*To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.