

## Coldrex MaxGrip x14 saszetek



Cena: 29,05 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	14 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Perrigo
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Substancja czynna	paracetamol, fenylefryna, witamina C
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

### Opis produktu

Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym zawiera kombinację trzech substancji aktywnych w rozgrzewającej formie saszetek do rozpuszczania. Paracetamol zmniejsza gorączkę i ból, a fenylefryna udrażnia nos. Lek zawiera także witaminę C, której niedobory mogą często wystąpić na początku zakażeń wirusowych. Coldrex MaxGrip zawiera maksymalną dostępną bez recepty dawkę paracetamolu.\*  
\* Maksymalna dawka paracetamolu w jednej saszetce dostępna bez recepty, Coldrex MaxGrip zawiera największą dawkę paracetamolu spośród produktów Coldrex.

### Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katar).

### Działanie

Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym dzięki wieloskładnikowej formule działa na 5 objawów grypy lub przeziębienia:

- gorączkę,
- dreszcze,
- bóle głowy,
- ból gardła,
- katar.

### Skład:

Paracetamol – działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,

Fenylefryna – obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe,  
Witamina C – witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

1 saszетка zawiera:

- Paracetamol - 1000 mg
- Fenylefryna - 10 mg
- Witamina C - 40 mg

## Jak stosować

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- Jedna saszетка co 4 do 6 godzin. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 4 saszетки na dobę.

## Sposób podawania

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszетки do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Jeżeli objawy choroby utrzymują się pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol, substancje zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa lub innymi lekami o podobnym mechanizmie działania. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 3 dni.