

## Dexak 25mg x30 tabletek

Cena: 29,35 PLN



### Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Berlin-Chemie
Postać	tabletki powlekane
Substancja czynna	deksketoprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

### Opis produktu

Dexak jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)

#### Wskazania:

Stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

#### Dawkowanie:

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

Zalecana dawka dobową to 1 powlekana tabletką (25 mg) co 8 godzin. Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 3 powlekanych tabletek (75 mg).

Tabletki leku należy połykać popijając wystarczającą ilością wody. Przyjmowanie tabletek z jedzeniem umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dotyczących żołądka lub jelit.

W przypadku ostrego bólu, kiedy potrzebne jest szybsze działanie zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek (co najmniej 30 minut przed posiłkiem), co spowoduje szybsze wchłanianie leku.

Jeśli po upływie 3 do 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### Przeciwwskazania:

- Tego leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
- Nie należy stosować leku Dexak w ciąży lub w okresie karmienia piersią.
- Jeśli pacjent ma uczulenia na jakikolwiek składnik leku.
- Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
- Jeśli u pacjenta występuje astma, lub w przeszłości występowały napady astmy, ostry alergiczny nieżyt nosa, polipy nosa, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub świszczący oddech po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.
- Jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka lub / i dwunastnicy, krwawienie z żołądka lub jelit lub przewlekłe problemy trawienne.
- Jeśli u pacjenta występowało krwawienie z żołądka lub jelit lub perforacje z powodu wcześniejszego podania leków z grupy NLPZ.
- Jeśli u pacjenta występują choroby jelit przebiegające z przewlekłym stanem zapalnym.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.
- Jeśli u pacjenta występuje nadmierna skłonność do krwawień lub zaburzeń krzepnięcia.

### Skład:

1 tabletkę powlekaną zawiera 36,90 mg trometamolu deksketoprofenu co odpowiada 25 mg deksketoprofenu.