

Famotydyna Ranigast 20mg x30 tabletek

Cena: 21,58 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	famotydyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

WSKAZANIA

Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, nadkwaśność.

SKŁAD I POSTAĆ

Każda tabletkę powlekana zawiera 20 mg famotydyny.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaobserwowano nadwrażliwość krzyżową w tej grupie związków, w związku z tym nie należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie. Niewydolność nerek.

STOSOWANIE

Dorośli

- W przypadku wystąpienia objawów zwykle stosuje się 1 tabletkę 20 mg na dobę.
- W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 20 mg 2 razy na dobę.

- Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabletki).
- Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
- Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie.
- Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.