

Faringan x20 tabletek do ssania

Cena: 14,14 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Solinea
Postać	tabletki do ssania
Substancja czynna	benzokaina, chlorheksydyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

FARINGAN wskazany jest w leczeniu miejscowym w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, takich jak:

- zapalenie jamy ustnej,
- zapalenie dziąseł,
- afty,
- zapalenie gardła.

Do stosowania przez osoby dorosłe i młodzież powyżej 12 roku życia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku FARINGAN:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chloroheksydynę, benzokainę lub którykolwiek
- z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy,
- u pacjentów chorych na methemoglobinemię (chorobę krwi związaną
- z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny, niezdolnej do przyłączenia i przenoszenia tlenu. Najczęstszym jej objawem jest sinica, powstająca w wyniku niedotlenienia tkanek),
- jeśli u pacjenta występują rany lub owrzodzenia jamy ustnej i gardła,
- jeśli u pacjenta występuje małe stężenie cholinesterazy w osoczu,

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: chloroheksydyny dichlorowodorek oraz benzokaina. Każda tabletko do ssania zawiera 5 mg chloroheksydyny dichlorowodorku i 1,5 mg benzokainy.