


Flegamina Classic 4mg/5ml o smaku malinowym syrop 200ml



Cena: 23,03 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	200ml
Podmiot odpowiedzialny	Teva
Postać	syrop
Substancja czynna	bromoheksyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 7 roku życia

Opis produktu

Skład:

Bromhexini hydrochloridum 0,08 g, Basis, corrigentia et conservantia ad 100,0 ml

Opis działania:

Bromoheksyna (Flegamina) jest zaliczana do leków mukolitycznych. Jest syntetyczną pochodną alkaloidu wazycyny otrzymanego z rośliny *Adhatoda vasicine*.

Bromoheksyna, przez depolimeryzację włókien mukoproteinowych, powoduje zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej. Dodatkowo zwiększa jej objętość i pobudza aktywność rzęsek nabłonka migawkowego błony śluzowej wyściełającej drogi oddechowe. Dzięki temu bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie.

Bromoheksyna jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym. Podlega biotransformacji w wątrobie. Wydalana jest z moczem w postaci metabolitów. Bromoheksyna przechodzi przez barierę krew - łożysko i do mleka matki.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania bromoheksyny są wszelkie stany chorobowe dróg oddechowych wymagające rozrzedzenia wydzieliny śluzowej lub ułatwienia odkrztuszania.

Wskazania do stosowania bromheksyny (Flegaminy):

- Przewlekłe i ostre zapalenia oskrzeli, także w postaci obturacyjnej
- Astma oskrzelowa
- Rozstrzenie oskrzeli
- Mukowiscydoza
- Oddechowa rehabilitacja pooperacyjna

Dawkowanie:

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania Flegaminę syrop stosuje się najczęściej:

Dzieci od 7 do 12 lat

- 3 razy dziennie 1 łyżeczka (5ml)

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

- 3 razy dziennie 2 łyżeczki (10ml)

1 łyżeczka (5 ml) syropu zawiera 4 mg bromheksyny.

Nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia ze względu na zawartość alkoholu w leku (0,2 g w 1 łyżeczce = 5 ml).
Lek przyjmować po posiłku.