

Flegamina Classic Junior 2mg/5ml o smaku truskawkowym syrop 120ml



Cena: 14,74 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	120ml
Podmiot odpowiedzialny	Teva
Postać	syrop
Substancja czynna	bromoheksyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu

Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat

- 10 ml (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

- 10 ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

- 20 ml (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę

Produkt leczniczy należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Produktu leczniczego nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny.

Skład

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodoru (Bromhexini hydrochloridum).