

# Furagina 50mg Apteo Med x30 tabletek

Cena: 12,50 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Synoptis Pharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	furagina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

## Opis produktu

Lek Furagina APTEO MED zawiera furazydynę jako substancję czynną. Furazydyna jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

## Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Furagina APTEO MED jest:

- zakażenie dolnych dróg moczowych.

## Skład

1 tabletki Furagina APTEO MED zawiera 50 mg furazydyny (Furazidinum).

## Dawkowanie

- Dorośli: pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę.
- Lek Furagina APTEO MED należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania leku.
- Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.
- Leku Furagina APTEO MED nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Furagina APTEO MED:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę, inne pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- W I trymestrze ciąży.
- W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej (niedokrwistości związanej z rozpadem krwinek czerwonych) u noworodka.
- U dzieci i młodzieży.
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.
- Jeśli u pacjenta występuje rozpoznana polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego), np. w przebiegu cukrzycy.
- Jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych).