

Furaginum Hasco Max 100mg x30 tabletek

Cena: 10,91 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Hasco-Lek
Postać	tabletki
Substancja czynna	furagina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 15 roku życia

Opis produktu

Skład

1 tabletkę zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum).

Wskazania

Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Pierwszy trymestr ciąży.
- Okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.
- Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat.
- Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).
- Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.
- Niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Jak stosować lek Furaginum Hasco MAX

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

- Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletka) 4 razy na dobe ; następnie dni: 100 mg (1 tabletka) 3 razy na dobe .

Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny. Kreska dzieląca umożliwia podzielenie tabletki na dwie równe dawki.

Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-10 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.