

Goprazol Max 20mg x14 kapsułek



Cena: 8,45 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	14 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	S-Lab
Postać	kapsułki
Substancja czynna	omeprazol
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Goprazol Max, 20 mg - wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów dorosłych.

Działanie:

Omeprazol, będący racemiczną mieszaniną dwóch enancjomerów, zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku w wyniku wysoce specyficznego mechanizmu działania. Jest on swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku jest szybkie i zapewnia kontrolę objawów przez odwracalne hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego przy podawaniu jeden raz na dobę.

Składniki:

Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolium).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda kapsułka dojelitowa, twarda 20 mg zawiera od 102 do 116 mg sacharozy.

Wskazania:

Goprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Dawkowanie i sposób podawania:

- Dawkowanie u dorosłych

- Zalecane dawkowanie to 10-20 mg raz na dobę przez 14 dni.

W obrocie dostępne są inne produkty zawierające omeprazol w dawce 10 mg i w razie konieczności zastosowania takiej dawki należy zastosować taki produkt.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

U większości pacjentów zgaga ustępuje całkowicie w ciągu 7 dni. Po uzyskaniu całkowitego ustąpienia dolegliwości leczenie należy zakończyć.

Pacjentów należy poinformować, że jeżeli objawy nie ustąpią w ciągu 14 dni powinni oni skontaktować się z lekarzem.

Szczególne populacje pacjentów

- Pacjenci z niewydolnością nerek
 - Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
- Pacjenci z niewydolnością wątroby
 - Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni poradzić się lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania produktu Goprazol Max.
- Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)
- U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Sposób podawania produktu

- Produkt Goprazol Max w postaci kapsułek należy przyjmować rano, przed jedzeniem, popijając połową szklanki wody.
- Kapsułkę należy połykać w całości. Kapsułki nie należy żuć ani kruszyć przed połknięciem.
- Dotyczy pacjentów z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które są w stanie pić lub połykać pokarm półstały

Należy otworzyć kapsułkę i jej zawartość rozpuścić w wodzie niegazowanej lub wymieszać z sokiem owocowym, lub musem jabłkowym. Zawiesinę należy wypić natychmiast (lub w czasie do 30 minut od przygotowania). W każdym przypadku zawiesinę należy wymieszać bezpośrednio przed wypiciem, a po jej przyjęciu należy wypić pół szklanki wody. **NIE NALEŻY UŻYWAĆ** mleka lub wody gazowanej. Powlekanych peletek dojelitowych nie wolno żuć.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem.