

Groprinosin 500mg x20 tabletek



Cena: 20,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Gedeon Richter
Postać	tabletki
Substancja czynna	inozyny pranobeks
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywoływanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie tabletek Groprinosin:

Sposób podawania: Podanie doustne. Aby ułatwić przyjęcie leku, tabletki mogą być rozkruszone i rozpuszczone w niewielkiej ilości płynu. Linia podziału na tabletkę ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedynczo podawane kilka razy na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, tj. 6 do 8 tabletek (zwykle 1 g, tj. 2 tabletki, podawane 3 do 4 razy na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawane w kilku dawkach podzielonych.

MASA CIAŁA / DAWKOWANIE

- 10-20 kg / 1-2 tabl.
- 20-30 kg / 2-3 tabl.
- 30-40 kg / 3-4 tabl.
- 40-50 kg / 4-5 tabl.

- 50-60 kg / 5-6 tabl.
- 60-70 kg / 6-7 tabl.
- 70-80 kg / 7-8 tabl.
- \geq 80 kg / 8 tabl.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Skład:

1 tabletkę zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum).