

Gynoxin Optima 200mg x3 kapsułki dopochwowe miękkie

Cena: 34,50 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	3 kapsułki
Podmiot odpowiedzialny	Recordati
Postać	kapsułki dopochwowe
Substancja czynna	fentikonazol
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, młodzież, od 16 roku życia, od 17 roku życia

Opis produktu

Gynoxin Optima jest produktem leczniczym stosowanym w grzybiczych infekcjach pochwy i sromu.

Skład

- Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).
 - 1 kapsułka dopochwowa zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu.
- Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), proszku parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjentki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.

Zwykle stosowana dawka:

1 kapsułka dopochwowa stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni. Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.

Działanie

Gynoxin Optima zawiera substancję czynną fentikonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne (bakterie Gram-dodatnie).

Wskazania

Lek Gynoxin Optima stosuje się w drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych:

- grzybicze zapalenie pochwy,
- grzybicze zapalenie sromu,
- upławy.

Przeciwwskazania

Leku Gynoxin Optima nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

- uczucie pieczenia sromu i pochwy,
- wysypka rumieniowa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

- nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
- upławy zabarwione krwią,
- rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
- ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
- działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem.

Gynoxin Optima zawiera oleje, które mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne (prezerwatywy, krażki).

Gynoxin Optima zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy. Substancje te mogą powodować podrażnienia.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Gynoxin Optima powinien być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią pod nadzorem lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek Gynoxin Optima nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Należy omówić z lekarzem stosowanie leku jeśli pacjentka nie ukończyła jeszcze 16. roku życia.