

Help 4 Skin GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY plaster w żelu 7ml



Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	7ml
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	żel
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Plaster w żelu wspomagający gojenie

- tworzy przezroczystą warstwę ochronną odporną na działanie wody
- wspomaga proces gojenia
- zapobiega ponownemu otwarciu rany
- zmniejsza ból

Wskazania

- Wspomaganie leczenia drobnych pęknięć skóry, spierzchniętej skóry dłoni i stóp oraz skaleczeń. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, produkt można również stosować do leczenia niewielkich pęknięć skóry powstałych w wyniku stopy cukrzycowej.
- Butelka 7 ml ze szpatułką ułatwiającą aplikację wystarcza na 80 aplikacji.

Sposób działania

Dzięki specjalistycznej technologii po nałożeniu preparatu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry na pękniętą skórę powstaje elastyczna i przezroczysta warstwa ochronna odporna na działanie wody, która szybko wysycha. Warstwa ta wspomaga leczenie pęknięć skóry spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, zmniejsza ból, zapobiega ponownemu otwarciu rany i wspomaga proces gojenia.

Wyjątkowa formuła plastra w żelu Help4Skin Gojenie pęknięć skóry została wzbogacona o:

- witaminę E - doskonały przeciwutleniacz, który sprzyja regeneracji skóry,
- olej rycynowy - substancję o działaniu zmiękczającym oraz zwiększającym sprężystość warstwy ochronnej.

Jak używać Help4Skin Gojenie pęknięć skóry

- umyć i osuszyć ranę, aż przestanie krwawić,
- nałożyć produkt odpowiednią szpательką, równomiernie pokrywając ranę oraz obszar wokół rany,
- pozostawić do wyschnięcia na kilka sekund,
- aplikować 2-3 razy dziennie, jeżeli to konieczne, aż do całkowitego wyleczenia rany,
- aby usunąć istniejącą warstwę, wystarczy ponownie nałożyć na nią odrobinę produktu,
- po użyciu dokładnie zamknąć butelkę,
- produkt użyć w trakcie 6 miesięcy od otwarcia opakowania.

Skład

Alkohol denat., alkohol izopropylowy, hydroksypropyloceluloza, nitroceluloza, octan etylu, octan tokoferylu, olej rycynowy.

Środki ostrożności

- nie używać produktu u dzieci poniżej 6 roku życia,
- aplikować na niewielkie miejscowe rany,
- po zastosowaniu może być odczuwalne delikatne i krótkotrwałe pieczenie, które po chwili ustępuje,
- w przypadku pojawienia się zaczerwienienia po zastosowaniu produktu należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem,
- nie połykać,
- nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,
- nie stosować produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone,
- produkt wysoce łatwopalny,
- produkt działa drażniąco na oczy,
- przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła,
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania i skutki uboczne:

- Nie aplikować na:
 - rany krwotoczne,
 - zakażone rany,
 - oparzenia,
 - błony śluzowe (wargi, odbył),
 - piersi,
 - okolice oczu.
- Nie używać w przypadku stwierdzonego uczulenia na jakikolwiek składnik produktu.