

Help 4 Skin SEPTI-SPRAY aerozol 50ml



Cena: 19,18 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50ml
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	aerozol
Substancja czynna	fenoksytanol, oktenidyny dichlorowodorek
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego. Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne małych powierzchownych ran.

Help4Skin SEPTI-SPRAY zawiera połączenie dwóch substancji leczniczych – oktenidynę oraz fenoksytanol – które zapewniają szeroki zakres działania dezynfekującego (zakres ich działania przeciwdrobnoustrojowego uzupełnia się wzajemnie). Badania in vitro potwierdzają działanie odkażające - bakteriobójcze i grzybobójcze – już w ciągu 1 minuty po zastosowaniu, a maksymalny efekt występuje w ciągu 2 godzin od aplikacji.

Postępowanie¹ zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Dichlorowodorek oktenidyny i fenoksytanol zawarte w Help4Skin SEPTI-SPRAY oprócz wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej charakteryzują się wysoką tolerancją dla skóry, błony śluzowej i tkanek, nie wpływają negatywnie (nie podrażniają, nie wysuszają) na skórę, błonę śluzową i tkanki, dzięki czemu nie spowalniają naturalnego procesu gojenia rany.

Help4Skin SEPTI-SPRAY ma szybkie działanie i trwały efekt - działa już w ciągu 1 minuty i wystarczy 1 raz dziennie.

Jak używać Help4Skin SEPTI-SPRAY

Produkt leczniczy Help4Skin SEPTI-SPRAY należy nanosić spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Nanoszenie

produktu leczniczego odbywa się poprzez wielokrotne naciskanie rozpylacza mechanicznego.

W przypadku leczenia antyseptycznego ran, produkt leczniczy Help4Skin SEPTI-SPRAY stosuje się raz na dobę przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Preparaty o działaniu odkażającym rany warto stosować:

- przed użyciem preparatów przyspieszających gojenie,
- przed zabezpieczeniem rany opatrunkiem i przy każdej jego zmianie,
- przed użyciem maści z antybiotykiem o działaniu miejscowym (jeżeli jest zalecona - przez lekarza), ponieważ to zapewni szersze działanie odkażające (także p/grzybicze)¹

Skład i postać

1 g roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodorku (Octenidini dihydrochloridum) i 20 mg fenoksyetanolu (Phenoxyethanolum).
Aerazol na skórę, roztwór Przezroczysty do lekko opalizującego, prawie bezbarwny roztwór o pH 5,5-6,5.

¹ Produkt przeznaczony do leczenia małych, powierzchniowych ran.