

# Honikan Gardło i kaszel żel x10 saszetek

Cena: 14,29 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	USP Zdrowie
Postać	żel
Substancja czynna	miód, mirt, prawoślaz, sok z daktyli, tymianek
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

## Opis produktu

### Złoty środek na gardło i kaszel

Żel ma działanie ochronne, które pomaga łagodzić dolegliwości górnych dróg oddechowych.

- Łagodzi podrażnienie i ból gardła
- Tworzy barierę ochronną na błonie śluzowej
- Łagodzi kaszel suchy i mokry

Żel zawiera miód, daktyle i ekstrakty roślinne z tymianku, mirtu i prawoślazu.

Preparat został opracowany w taki sposób, aby przylegać do błony śluzowej jamy ustnej i ograniczać jej kontakt z czynnikami zewnętrznymi: polisacharydy mają zdolność pochłaniania dużych ilości wody, co pomaga utrzymać poziom nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (przy kaszlu suchym) oraz sprzyja upłynnianiu i usuwaniu śluzu (przy kaszlu mokrym).

### Składniki

Woda, Miód, Koncentrat soku z daktyli, Suchy ekstrakt z liści tymianku, Suchy ekstrakt z korzenia prawoślazu, Suchy ekstrakt z liści mirtu, Karboksymetyloceluloza sodowa, Guma ksantanowa, Kwas cytrynowy, Aromat cytrynowy, Sorbinian potasu, Benzoesan sodu, Olejek eteryczny z mirtu.

- BEZGLUTENOWY,
- NATURALNIE BEZ LAKTOZY

## Wskazania

Wyrób medyczny na bazie miodu, daktyli i ekstraktów roślinnych, wskazany w leczeniu bólu gardła oraz w przypadku kaszlu zarówno suchego, jak i mokrego. Żel wyciśnięty bezpośrednio z saszetki do jamy ustnej zaczyna działać ochronnie i w konsekwencji przynosi ulgę.

Działa ochronnie i łagodząco na górne drogi oddechowe. Jego składniki przylegają do błony śluzowej jamy ustnej i ograniczają jej kontakt z czynnikami zewnętrznymi.

## Dawkowanie i sposób użycia

Żel do bezpośredniego stosowania.  
Wycisnąć zawartość saszetki do ust.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- 1 saszetka, 2 do 4 razy dziennie lub postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie trzeba długo czekać pomiędzy zastosowaniem kolejnych saszetek. Nie jeść i nie pić przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu.  
Okres stosowania zależy od potrzeby i szybkości ustępowania objawów.  
W razie potrzeby produkt może być stosowany dłużej, nawet 30 dni.