

Ibufen dla Dzieci Forte 200mg/5ml zawiesina o smaku truskawkowym 40ml



Cena: 12,59 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	40ml
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	zawiesina
Substancja czynna	ibuprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Wskazania

- Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych).
- Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).

Bezpieczna formuła

- Pierwszy i jedyny ibuprofen w zawieszynie w wersji FORTE bez cukru i bez barwników.
- Może być podawany również dzieciom z alergią na barwniki spożywcze lub chorym na cukrzycę.
- Posiada system dozowania pozwalający na łatwe i precyzyjne odmierzenie leku.

Sposób użycia:

Zalecana dawka:

- Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy życia (5 – 7,6 kg): dawka początkowa 1,25 ml (co odpowiada 50 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 1,25 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 3,75 ml (co odpowiada 150 mg ibuprofenu).
- Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy życia (7,7 – 9 kg): dawka początkowa 1,25 ml (co odpowiada 50 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 1,25 ml co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 3,75 ml do 5 ml (co odpowiada 150 – 200 mg ibuprofenu).

- Dzieci od 1 roku do 3 lat (10 – 15 kg): dawka początkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 7,5 ml (300 mg ibuprofenu).
- Dzieci od 4 do 6 lat (16 – 20 kg): dawka początkowa 3,75 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 10 ml (450 mg ibuprofenu).
- Dzieci od 7 do 9 lat (21 – 29 kg): dawka początkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 15 ml (600 mg ibuprofenu).
- Dzieci od 10 do 12 lat (30 – 40 kg): dawka początkowa 7,5 ml (co odpowiada 300 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 7,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 22,5 ml (900 mg ibuprofenu).
- Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli: dawka początkowa 5 ml do 10 ml (co odpowiada 200 mg do 400 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 30 ml (1200 mg ibuprofenu).

Skład

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.