

# Ibum Forte Pure 200 mg/5 ml zawiesina 100g



Cena: 26,11 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Podmiot odpowiedzialny	Hasco-Lek
Postać	zawiesina
Substancja czynna	ibuprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 3 miesiąca życia

## Opis produktu

**Jedyny na rynku<sup>1</sup>. Bez aromatów i barwników. Na ból, gorączkę i stan zapalny. Dawka FORTE zawiera 200mg ibuprofenu w 5ml zawiesiny.**

IBUM FORTE PURE to bezpieczny<sup>2</sup> i sprawdzony<sup>3</sup> lek na gorączkę i ból u dzieci. Jedyna na rynku zawiesina bez zbędnego dodatku aromatów i barwników. Szybko obniża gorączkę, bo w 15 minut i działa nawet do 8 godzin<sup>4</sup>. Na najczęstsze dziecięce dolegliwości. Dawka FORTE to mało płynu do podania.

## IBUM FORTE PURE

- na ból
- na gorączkę
- na stan zapalny
- szybko obniża gorączkę, już w 15 minut<sup>4</sup>
- długo działa, nawet do 8 godzin<sup>4</sup>
- przyjemny słodki smak
- bez aromatów
- bez barwników
- bez cukru
- mało leku do podania
- łatwe podanie leku
- strzykawka doustna

## DAWKOWANIE

Lek stosuje się doustnie. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna. Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.

Dawka dobową leku IBUM FORTE ściśle zależy od masy ciała i wynosi 20-30 mg/kg mc., w dawkach podzielonych, zgodnie z tabelą:

3-6 miesięcy / 5-7,6 kg

- Dawka jednorazowa – 1,25 ml (50 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3 x 1,25 ml (150 mg)

6-12 miesięcy / 7,7-9 kg

- Dawka jednorazowa – 1,25 ml (50 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3-4 x 1,25 ml (150-200 mg)

1-3 lata / 10-15 kg

- Dawka jednorazowa – 2,5 ml (100 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3 x 2,5 ml (300 mg)

4-6 lat / 16-20 kg

- Dawka jednorazowa – 3,75 ml (150 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3 x 3,75 ml (450 mg)

7-9 lat / 21-29 kg

- Dawka jednorazowa – 5 ml (200 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3 x 5 ml (600 mg)

10-12 lat / 30-40 kg

- Dawka jednorazowa – 7,5 ml (300 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3 x 7,5 ml (900 mg)

powyżej 40 kg

- Dawka jednorazowa – 7,5-10 ml (300-400 mg)
- Maksymalna dawka dobową – 3-4 x 7,5 ml (900-1200 mg)

## SKŁAD

5 ml zawiesiny zawiera: ibuprofen (Ibuprofenum) 200 mg.

## WSKAZANIA

Stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii

w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy. Nie stosować u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Nie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub nawracającą w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również występującym po zastosowaniu NLPZ. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA). Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Nie stosować w III trymestrze ciąży. Nie stosować u pacjentów, u których występuje naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia), skazą krwotoczną. Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takimi jak małopłytkowość.

<sup>1</sup> Jedyna zawiesina bez cukru, bez aromatów i bez barwników (02A2M GENERAL PAIN PAED-MIXT.OR, IQVIA POLAND NATIONAL SALES DATA 03/2020)

<sup>2</sup> Lek nie zawiera barwników, cukru, alkoholu oraz przeznaczony jest dla dzieci od 3 miesiąca życia

<sup>3</sup> IBUM FORTE dostępny od 2012 roku, 7 942 008 sprzedanych opakowań IBUM FORTE, IQVIA POLAND NATIONAL SALES DATA, w latach 2012-2019

<sup>4</sup> Barbagallo M, Sacerdote P. Ibuprofen in the treatment of children's inflammatory pain: a clinical and pharmacological overview. *Minerwa Pediatr* 2019; 71:82-99