

Iladian Direct Plus x10 tabletek dopochwowych

Cena: 19,97 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	tabletki dopochwowe
Substancja czynna	inulina, kwas hialuronowy (hialuronian sodu), witamina C, witamina E
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

CZYM JEST ILADIAN DIRECT PLUS?

Wyrób medyczny Iladian direct plus to tabletki dopochwowe, które poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarzają warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

Iladian direct plus przeznaczonych jest dla kobiet, które narażone są na wszelkie zaburzenia flory bakteryjnej, wynikające zarówno z infekcji, jak i złych nawyków higienicznych. Jego stosowanie wskazane jest w:

- zapobieganiu i wspomaganiu leczenia bakteryjnego zakażenia pochwy,
- łagodzeniu dolegliwości takich jak suchość i uczucie napięcia błony śluzowej pochwy,
- w trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych,
- w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
- kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium

JAKI JEST SKŁAD I DZIAŁANIE ILADIAN DIRECT PLUS?

Iladian direct plus to jedyne tabletki dopochwowe zawierające:

- inulinę – która wspomaga namnażanie bakterii tworzących naturalną florę bakteryjną pochwy
- kwas L-askorbinowy – który zakwasza środowisko pochwy hamując rozwój niepożądanych drobnoustrojów

- witaminę E i kwas hialuronowy – które nawilżają błonę śluzową pochwy zmniejszając podatność na mikrourazy.

JAK STOSUJE SIĘ ILADIAN DIRECT PLUS?

- Iladian direct plus może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i we wspomaganiu leczenia.
- Podczas wspomagania leczenia bakteryjnego zakażenia pochwy należy stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.
- W profilaktyce należy stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.