

# Inaldin Gardło 1,5 mg/ml aerozol 30ml



Cena: 15,02 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	30ml
Podmiot odpowiedzialny	Bausch Health
Postać	aerozol
Substancja czynna	benzydamina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

## Opis produktu

### Wskazania i działanie:

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

### Co zawiera lek INALDIN Gardło– skład:

1,5 mg/ml benzydamin chlorowodoru (Benzydamin hydrochloridum)

### Dawkowanie - jak stosować INALDIN Gardło:

#### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

od 4 do 8 dawek aerozolu (zawierają od 1,02 do 2,04 miligramów benzydamin chlorowodoru, co odpowiada od 0,91 do 1,82 miligramów benzydamin) od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

#### Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

- 4 dawki aerozolu (zawierają 1,02 miligramów benzydamin chlorowodoru, co odpowiada 0,91 miligramów benzydamin) od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

- 1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała (zawiera 0,26 miligramów benzydaminę chlorowodoru, co odpowiada 0,23 miligramów benzydaminę na 4 kg masy ciała) od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 4 dawki (zawierają 1,02 miligramów benzydaminę chlorowodoru, co odpowiada 0,91 miligramów benzydaminę).

Osoby w podeszłym wieku

- Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania. Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Leczenie nie może przekraczać 7 dni.

## Sposób podawania

- Podanie dogardłowe.
- Ustawić końcówkę dozownika w pozycji poziomej. Jeśli produkt stosuje się po raz pierwszy, trzymając butelkę w pozycji pionowej, należy mocno nacisnąć dozownik kciukiem bądź palcem wskazującym. Czynność należy powtórzyć 5 razy w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia. Jeśli lek stosuje się po raz kolejny, dozownik należy nacisnąć 2 razy. Następnie należy skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej i nacisnąć dozownik.

## Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku INALDIN Gardło?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy unikać kontaktu produktu z oczami.
- U niewielu pacjentów może wystąpić owrzodzenie policzków lub gardła spowodowane przez ciężką chorobę. Dlatego pacjenci, u których objawy nasiliły się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni, lub u których wystąpi gorączka lub inne objawy, muszą zasięgnąć odpowiedniej porady lekarza lub dentysty.
- Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać reakcje alergiczne. - Jeśli to nastąpi, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej terapii.
- Nie zaleca się stosowania benzydaminę w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi w wywiadzie, ponieważ u tych osób może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Ten produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) (patrz punkt 2), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Ten produkt leczniczy zawiera 81,40 mg alkoholu (etanolu) w każdym mililitrze co odpowiada 13,84 mg / 0,17 ml (jedna dawka). - Zawartość etanolu w jednej dawce (0,17 ml) tego produktu jest równoważna mniej niż 0,4 ml piwa lub 0,2 ml wina. Niewielka ilość alkoholu w tym produkcie nie spowoduje żadnych zauważalnych skutków.
- Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej dawce (0,17 ml), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

## Działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego

- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). – reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- Bardzo rzadko (< 1/10 000) – skurcz krtani

Zaburzenie żołądka i jelit

- Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) – pieczenie i suchość w jamie ustnej

## Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- Niezbyt często ( $\geq 1/1000$  do  $< 1/100$ ) – nadwrażliwość na światło
- Bardzo rzadko ( $< 1/10\ 000$ ) – obrzęk naczynioruchowy

Wkrótce po przyjęciu leku może wystąpić uczucie drętwienia lub pieczenia w jamie ustnej lub gardle. Taka reakcja jest związana z normalnym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności lub wymioty, które są wywołane przez odruch podrażnienia gardła, związany z przyjęciem leku. Objawy te ustępują samoistnie po przerwaniu przyjmowania leku.

## Przedawkowanie:

- Bardzo rzadko zgłaszano objawy przedawkowania, takie jak pobudzenie, drgawki, pocenie się, ataksja, drżenie i wymioty po doustnym przyjęciu benzydaminu w dawkach znacznie większych niż zalecane. W przypadku ostrego przedawkowania możliwe jest jedynie leczenie objawowe. Należy opróżnić żołądek wywołując wymioty lub wykonując pukanie żołądka, a następnie uważnie obserwować pacjenta i zapewnić mu opiekę. Konieczne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta.

## Przechowywanie / Okres ważności:

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C
- 3 lata.
- Okres ważności po pierwszym użyciu: 160 dni.

## Podmiot odpowiedzialny:

- Bausch Health Ireland Limited
- 3013 Lake Drive
- Citywest Business Campus
- Dublin 24, D24PPT3
- Irlandia

## Wytwórca:

- ICN Polfa Rzeszów S.A.
- Ul. Przemysłowa 2
- 35 – 959 Rzeszów

## Galeria



**BÓL**

**POTRÓJNE DZIAŁANIE  
W WALCE Z BÓLEM GARDŁA**

INALDIN Gardlo, 1,5 mg/ml. Skład: aktywna dawka amoniaku 0,17 mg i lewametyl 200 mg benzodiazepiny chlorowodorku. Benzodiazepina i lewametyl. Potrzebna pomoc medyczna: amoniak do stosowania w postaci żelowej, lewametyl. Wskazania do stosowania: Ciężkie objawy bólu i zaczerwienienie, obrzęk i opuchnięcie w obrębie gardła i jamy ustnej. Potrzebni odpowiedzialesci: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



**BÓL**

**DZIAŁA ZNIECZULAJĄCO  
ZWALCZA BÓL  
LECZY STAN ZAPALNY**

INALDIN Gardlo, 1,5 mg/ml. Skład: aktywna dawka amoniaku 0,17 mg i lewametyl 200 mg benzodiazepiny chlorowodorku. Benzodiazepina i lewametyl. Potrzebna pomoc medyczna: amoniak do stosowania w postaci żelowej, lewametyl. Wskazania do stosowania: Ciężkie objawy bólu i zaczerwienienie, obrzęk i opuchnięcie w obrębie gardła i jamy ustnej. Potrzebni odpowiedzialesci: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



**DAWKOWANIE  
I SPOSÓB PODAWANIA**

INALDIN Gardlo		
 Dzieci poniżej 6 roku życia	1 dawka na 4 kg masy ciała	2-6 razy na dobę
 Dzieci od 6 do 12 lat**	4 dawki	2-6 razy na dobę
 Dorosli i dzieci >12 roku życia**	4-8 dawek	2-6 razy na dobę

INALDIN Gardlo, 1,5 mg/ml. Skład: aktywna dawka amoniaku 0,17 mg i lewametyl 200 mg benzodiazepiny chlorowodorku. Benzodiazepina i lewametyl. Potrzebna pomoc medyczna: amoniak do stosowania w postaci żelowej, lewametyl. Wskazania do stosowania: Ciężkie objawy bólu i zaczerwienienie, obrzęk i opuchnięcie w obrębie gardła i jamy ustnej. Potrzebni odpowiedzialesci: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.