

# Jasnum Comfort globulki dopochwowe x10 sztuk



Cena: 45,41 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	USP Zdrowie
Postać	globulki
Substancja czynna	glicerydy, glikogen, kwas hialuronowy (hialuronian sodu), mleczan sodu, witamina E
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

Globulki Jasnum comfort są przeznaczone dla kobiet w celu łagodzenia dyskomfortu, uczucia suchości oraz napięcia, świądu i pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie zapobiega uszkodzeniom nabłonka podczas aktywności ruchowej, stosunków płciowych lub badań ginekologicznych.

- nawilża, chroni i przywraca elastyczność błony śluzowej pochwy,
- przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej,
- redukuje nieprzyjemny zapach

Sól sodowa kwasu hialuronowego i octan tokoferylu (witamina E)

- obecne w produkcie zabezpieczają i nawilżają błonę śluzową pochwy.

Kwas Mlekowy

- Zastosowany w wyrobie medycznym Jasnum comfort kwas mlekowy wspomaga zachowanie właściwego pH pochwy na poziomie <4,5 (odczyn kwaśny), co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej.

## Mechanizm działania wyrobu

Po aplikacji Jasnum comfort dopochwowo, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

## Sposób użycia

Uwaga:

- Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
- Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
- Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce, do momentu stwardnienia globulki.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania stosować 1 globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej. Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!

## Ostrzeżenia i przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.
- Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.
- W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w czasie menstruacji.
- Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.
- Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.
- Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.
- Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.
- Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie), zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują.

## Składniki

1 globulka zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu (Witamina E), mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.