

# Lactulose-MIP 9,75g/15ml syrop 500ml



Cena: 35,77 PLN

## Opis słownikowy

|                        |   |
|------------------------|---|
| Opakowanie             | 500ml                                     |
| Podmiot odpowiedzialny | MIP Pharma                                |
| Postać                 | syrop                                     |
| Substancja czynna      | laktuloza                                 |
| Typ produktu           | produkt leczniczy                         |
| Wiek                   | dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia |

## Opis produktu

### Skład leku:

15 ml syropu zawiera: substancję czynną: 9,75 g (Lactulosum) laktuloza

### Opis działania:

Preparat Lactulose-MIP charakteryzuje się łagodnym działaniem przeczyszczającym. Laktuloza to dwucukier nie ulegający trawieniu i wchłanianiu w jelicie cienkim. W jelicie grubym, gdzie stanowi pożywkę dla bakterii sacharolitycznych ulega rozpadowi do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu mlekowego i octowego, oraz do metanu i wodoru. Obniżenie pH i działanie osmotyczne jest bodźcem do przyspieszenia perystaltyki jelit. Preparat zmniejsza ponadto wchłanianie jonów amonowych i innych toksycznych związków azotu. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia leku w pełnej dawce.

### Wskazania do stosowania:

Zaparcia. Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

### Przeciwwskazania:

Syropu Lactulose-MIP nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na laktulozę lub którykolwiek składnik preparatu, niedrożności jelit, zapalenia przewodu pokarmowego oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Laktulozy nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy, z zaburzeniami w wydzielaniu laktazy, z galaktozemią lub z zaburzeniami wchłaniania jelitowego

glukozy oraz galaktozy.

### Dawkowanie i sposób podawania:

Laktulozę należy przyjmować doustnie. Dawki należy dostosować do stanu pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby. Do dawkowania syropu służy dołączona do opakowania miarka.

### Zaparcia

Dawka początkowa / Dawka podtrzymująca

- Dorośli i młodzież (14-17 lat)
  - 15-45 ml w 1 lub 2 dawkach podzielonych co odpowiada 9,75-29,25 g laktulozy / 15-30 ml co odpowiada 9,75-19,5 g laktulozy
- Dzieci (7-14 lat) 15 ml co odpowiada 9,75 g laktulozy / 10-15 ml co odpowiada 6,5-9,75 g laktulozy
- Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml co odpowiada 3,25-6,5 g laktulozy / 5-10 ml co odpowiada 3,25-6,5 g laktulozy
- Niemowlęta (poniżej 1 roku) do 5 ml co odpowiada do 3,25 g laktulozy / do 5 ml co odpowiada do 3,25 g

### Encefalopatia wątrobowa:

Dawki należy zwiększać stopniowo.

Dorośli: początkowo 10 do 15ml syropu Lactulose-MIP (6 do 10g laktulozy) 3 razy na dobę, później zwiększyć do 30-40 ml syropu Lactulose-MIP (20 do 30 g laktulozy) 3 do 4 razy na dobę.

Dawkowanie należy tak dostosować, żeby pacjent wydalął luźny stolec 2 do 3 razy na dobę.