

Laremid 2mg x20 tabletek

Cena: 13,97 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	loperamid
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu

Działanie:

Zawarty w preparacie loperamid hamuje motorykę jelit działając bezpośrednio na mięśnie gładkie ściany jelita, zmniejsza wydzielanie nabłonka jelitowego. Lek zwalnia szybkość pasażu treści jelitowej przez przewód pokarmowy, zmniejsza liczbę wypróżnień i poprawia konsystencję stolca.

Wskazania:

Lek znajduje zastosowanie w objawowym leczeniu biegunek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia. W leczeniu biegunki w przebiegu zaburzeń czynnościowych jelit. W lekkich zaostrzeniach nieswoistych zapaleń jelit. U pacjentów po operacjach, u których dokonano przetoki jelitowej.

Dawkowanie:

Lek podaje się w dawce i z częstotliwością ustaloną przez lekarza.

Zwykle podaje się:

- początkowo w ostrej biegunce 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po każdym nieprawidłowym wypróżnieniu.

Maksymalna dawka leku nie może przekraczać 8 tabletek na dobę.

W biegunce przewlekłej zwykle na początku podaje się 2 razy po 1 tabletkę, w razie potrzeby zwiększając dawkę do 4-6 na dobę.

Leku nie należy podawać w stanach niedrożności jelit, w zaparciach, w ciężkim rzucie zapaleń nieswoistych jelit. Lek nie powinien być podawany dzieciom do 2 roku życia.

Skład

1 tabletkę zawiera 2mg chlorowodoru loperamidu.