

Loratadyna Pylox 10mg x10 tabletek

Cena: 11,27 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Galena
Postać	tabletki
Substancja czynna	loratadyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu

Lek Loratadyna Pylox wskazany jest w celu łagodzenia objawów, takich jak: kichanie, swędzenie, wodnista wydzielina z nosa, obrzęk błon śluzowych, świąd i pieczenie oczu, spowodowanych przez sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Lek Loratadyna Pylox jest także wskazany w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (swędzenie, zaczerwienienie skóry).

Wskazania:

Leczenie objawów:

- sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
- przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na loratadynę lub inny składnik leku.

Skład:

1 tabletki zawiera 10 mg loratadyny.

Stosowanie:

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: stosuje się dawkę w zależności od masy ciała:

- masa ciała mniejsza niż 30 kg:
 - dzieci w wieku powyżej 6 lat: 5 mg (pół tabletki) raz na dobę,
 - dzieci w wieku od 2 do 6 lat: nie jest wskazane stosowanie tabletek u dzieci w wieku poniżej 6 lat; u tych pacjentów zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu (5 mg).
- masa ciała większa niż 30 kg:
 - 10 mg (1 tabletki) raz na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- 10 mg (1 tabletki) raz na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

- u pacjentów dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg z ciężką niewydolnością wątroby: zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg (1 tabletki) co drugi dzień,
- u dzieci o masie ciała 30 kg lub mniejsze: 5 mg (pół tabletki) co drugi dzień.