

Maść kamforowa 10% Amara 20g

Cena: 7,33 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20g
Podmiot odpowiedzialny	Amara
Postać	maść
Substancja czynna	kamfora
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Pomocniczo w przeziębieniach.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu. Nie stosować w przypadku naruszenia ciągłości skóry. Nie stosować u dzieci do 6 roku życia.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść kamforowa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku wystąpienia duszności lub niepokojących objawów, natychmiast zwrócić się do lekarza.
- Nie stosować w okolicy nosa i twarzy.

Lek Maść kamforowa a inne leki

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Nie są znane interakcje wynikające z zastosowania maści zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Lek nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Zastosowanie

Lek Maść kamforowa zawiera substancję czynną – kamforę. Kamfora rozszerza naczynia krwionośne wywołując miejscowe przekrwienie. Lek wykazuje działanie rozgrzewające w łagodnych bólach mięśniowych i nerwobólach. Preparat stosowany pomocniczo w przeziębieniach.

Działanie

Rozgrzewające w łagodnych bólach mięśniowych i nerwobólach.

Działania niepożądane

- Jak każdy lek, Maść kamforowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Po wielokrotnym wcieraniu może nastąpić podrażnienie, a nawet zapalenie skóry.

Skład

Co zawiera lek Maść kamforowa

- Substancją czynną leku jest kamfora.
- 100 g maści zawiera 10 g kamfory.
- Pozostałe składniki leku to: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała).

Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować zewnętrznym na skórę nieuszkodzoną.

Zalecane dawkowanie:

- Młodzież i dorośli: wycisnąć z tuby 5 – 10 cm maści (1 – 2 g), wcierać w obolałe miejsca 1 do 3 razy dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 roku życia: wycisnąć z tuby 0,5 – 1 cm maści (50 – 100 mg), nacierać plecy raz dziennie, np. wieczorem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa

- Lek do stosowania miejscowego.
- W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa

- Należy zastosować następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść kamforowa

- W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.