

## MaxiBiotic maść x10 saszetek

Cena: 20,20 PLN



### Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Bausch Health
Postać	maść
Substancja czynna	bacytracyna, neomycyna, polimyksyna B
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

### Opis produktu

#### Wskazania i działanie:

MaxiBiotic to lek w postaci maści, zawierający 3 antybiotyki – neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę. Wykazują one uzupełniający się zakres działania przeciwbakteryjnego wobec drobnoustrojów chorobotwórczych, będących przyczyną większości zakażeń skóry.

Maxibiotic jest pomocny w leczeniu drobnych ran, powstałych w wyniku otarć, zadrapań, skaleczeń, ukąszeń, oparzeń, a także pogryzienia przez zwierzęta.

- Maść z antybiotykiem dostępna bez recepty.
- 1 lek = 3 aktywne składniki.
- Przyspiesza gojenie, nawilża okolice uszkodzonego naskórka i działa przeciwbakteryjnie.
- Minimalizuje ryzyko powstania infekcji i wpływa pozytywnie na zapobieganie powstawania blizn.

#### Wskazania do stosowania maści MaxiBiotic to:

- drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia),
- oparzenia,
- owrzodzenia skóry.

#### Skład – co zawiera lek MaxiBiotic:

- 1 g maści (pojedyncza saszetka) MaxiBiotic zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycynisulfas), 5000 IU polimyksyny B siarczanu (PolymyxiniBsulfas), 400 IU bacytracyny cynkowej (Bacitracinumzincum) oraz substancję pomocniczą – wazelinę

białą.

### Dawkowanie – jak stosować lek MaxiBiotic:

- Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Podanie na skórę.
- Należy oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością maści. - Nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2-5 razy na dobę. Miejsce nałożenia maści można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.
- Nie należy stosować dłużej niż 7 dni.
- Po zakończeniu leczenia nie należy ponownie stosować produktu leczniczego przed upływem 3 miesięcy.

Dzieci i młodzież:

- Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku od 0 do 12 lat.

### Kiedy nie stosować leku MaxiBiotic:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku,
- jeśli pacjent ma zaburzenia słuchu,
- na głębokie rany kłute, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (szkodliwe działanie na słuch, nerki),
- do oczu.

### Lek MaxiBiotic a inne leki:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Po zastosowaniu maści MaxiBiotic na dużą powierzchnię lub uszkodzoną skórę mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami.
- Równoczesne zastosowanie leku MaxiBiotic z doustnie podawaną neomycyną może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych.
- Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Nasilone zostaje wówczas ryzyko powstania zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku.
- Podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami o szkodliwym działaniu na nerki, słuch lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie działań niepożądanych.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Długotrwałe stosowanie leku MaxiBiotic może powodować nadmierne namnażanie niewrażliwych na lek drobnoustrojów, w tym grzybów, podobnie jak w przypadku stosowania innych leków zawierających antybiotyki.
- Jeśli wystąpią działania niepożądane, zwłaszcza podrażnienie w miejscu nałożenia leku lub pacjent stwierdzi brak poprawy, należy zaprzestać stosowania leku MaxiBiotic i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub upośledzeniem słuchu

- Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu powinni ostrożnie stosować ten lek, ponieważ istnieje u nich większe prawdopodobieństwo wystąpienia działania szkodliwego na nerki i słuch.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

- Nie ma szczególnych wymagań dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić

się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

- Ze względu na brak odpowiednich badań, nie należy stosować leku w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Nie stwierdzono wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

### Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Częstość występowania działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

- zakażenie opornymi szczepami bakterii lub grzybów

Zaburzenia układu immunologicznego:

- miejscowe objawy nadwrażliwości (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia)

Zaburzenia ucha i błędnika:

- ototoksyczność

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- nefrotoksyczność

### Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

### Podmiot odpowiedzialny:

- Bausch Health Ireland Limited
- 3013 Lake Drive
- Citywest Business Campus
- Dublin 24, D24PPT3
- Irlandia

