

Metafen x10 tabletek

Cena: 9,78 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	paracetamol, ibuprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle.
Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Sposób użycia

Dorośli:

- jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
- W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.
- Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- jednorazowo 1 tabletkę.
- W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.
- Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Jeśli dolegliwości utrzymują się po 3 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań

niepożądanych.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- Ibuprofen 200 mg
- Paracetamol 325 mg

Przeciwwskazania

- uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- uczulenie (nadwrażliwość) na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
- ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub krwawień, również tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ
- ciężkie nadciśnienie tętnicze
- ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej
- ciężka niewydolność serca
- ciąża i karmienie piersią
- jednoczesne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego)
- zatrzymanie moczu
- jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2
- u pacjentów u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6 fosforanowej
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat
- choroba alkoholowa