

# Minovivax 2% roztwór na skórę 100ml



Cena: 45,35 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	100ml
Podmiot odpowiedzialny	Aristo Pharma
Postać	płyn
Substancja czynna	minoksydyl
Typ produktu	produkt leczniczy
Typ włosów	wypadające
Wiek	dorośli

## Opis produktu

Minovivax 2% to produkt leczniczy stosowany na skórę głowy w przypadku nadmiernego wypadania i w celu pobudzenia wzrostu włosów. Jest stosowany w łysieniu typu męskiego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

## Skład

- Substancją czynną leku jest minoksydyl (Minoxidilum).
- 1 ml roztworu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu.

## Dawkowanie

Dorośli powyżej 18 lat dawkę 1 ml (sześć naciśnień pompki) produktu leczniczego Minovivax 2% należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Nie przekraczać dawki dobowej 2 ml bez względu na wielkość powierzchni skóry objętej zmianami.

- Przed miejscowym zastosowaniem produktu leczniczego Minovivax 2% należy całkowicie osuszyć włosy i skórę głowy.
- Aplikować roztwór na środkową część powierzchni skóry objętej zmianami i rozprowadzić opuszkami palców, upewniając się, że produkt leczniczy został równomiernie nałożony.
- Dla zapewnienia bardziej precyzyjnego miejscowego nałożenia, należy użyć aplikatora dołączonego do opakowania.
- Po aplikacji roztworu zawsze należy dokładnie umyć ręce.
- Produktu leczniczego nie należy aplikować na części ciała inne niż skóra głowy.

## Wskazania

Minovivax 2% jest wskazany w leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Minovivax 2%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie jest on wskazany do stosowania w leczeniu łysienia plackowatego (nagła lub niewyjaśniona utrata włosów)
- podczas leczenia cytostatycznego (przeciwnowotworowego)
- w przypadku wypadania włosów spowodowanego stosowaniem niewłaściwej diety
- w przypadku wypadania włosów spowodowanego zakończeniem stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych
- na uszkodzoną skórę głowy (np. w wyniku oparzeń, owrzodzenia lub w przypadku występowania tkanki bliznowatej)
- jeżeli wypadanie włosów zostało spowodowane przez niewłaściwą pielęgnację włosów (np. zbyt mocne wiązanie włosów)
- podczas ciąży oraz karmienia piersią
- w przypadku wypadania włosów po porodzie

Jeżeli pacjent nie jest pewien jaka jest przyczyna utraty włosów, powinien skontaktować się z lekarzem.