

## Nurofen Mięśnie i Stawy 200mg x4 plastry

Cena: 41,75 PLN



### Opis słownikowy

Podmiot odpowiedzialny	Reckitt Benckiser
Postać	plaster
Substancja czynna	ibuprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 16 roku życia

### Opis produktu

#### Cechy produktu

- Jeden plaster na całą dobę
- Działają przeciwzapalnie
- Działanie potwierdzone badaniami
- Nie krępują ruchów
- Dyskretne

#### Opis produktu

Produkt leczniczy Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego, miejscowego bólu spowodowanego ostrym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

#### Składniki

Każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) oraz substancje pomocnicze (pełny wykaz substancji pomocniczych znajduje się w Ulotce dla pacjenta)

#### Informacje dotyczące stosowania

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Zalecana dawka:

- Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej: Jedna dawka równa jest jednemu plasterowi.
- Maksymalna dawka w okresie 24 godzin to jeden plaster.
- Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
- Do stosowania na nieuszkodzoną skórę.
- Przed nałożeniem plastra zaleca się dokładne umycie i osuszenie miejsca aplikacji.
- Plaster można nakładać o dowolnej porze w ciągu dnia lub nocy, ale należy go usunąć i nakleić nowy plaster następnego dnia o tej samej porze. Plaster jest elastyczny i łatwo dopasowuje się do ruchomych powierzchni ciała, dlatego w razie potrzeby można go nakładać na staw lub w jego pobliżu. Plaster umożliwia wykonywanie normalnego ruchu.

Nie należy:

- przecinać plastra, należy go nakładać w całości,
- stosować na uszkodzoną lub zranioną skórę,
- pokrywać go innymi plastrami lub nieprzepuszczalnymi opatrunkami w tym bandażami
- moczyć plastra.

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje alergiczne w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związane z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę; trzeci trymestr ciąży, stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe.