

Olimp Gold-Vit C + Tran x30 kapsułek

Cena: 27,82 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Olimp Laboratories
Postać	kapsułki
Substancja czynna	kwasy Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3 (EPA), witamina A, witamina C, witamina D
Typ produktu	suplement diety
Wiek	dorośli

Opis produktu

Wyjątkowe połączenie dwóch składników pomagających w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Preparat zawiera olej z wątroby dorsza (tran) oraz wysoką ilość witaminy C. Dorsz odławiany jest w czystych wodach Islandii, a jakość i czystość pochodzącego z jego wątroby oleju jest potwierdzona w szczegółowych badaniach laboratoryjnych.

Olej z wątroby dorsza uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy D i A. Cechuje się też wysoką zawartością kwasów EPA i DHA. Suplement diety Gold Vit C + Tran zawiera witaminy C i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Składniki

Informacja żywieniowa:

1 kapsułka

◦ Witamina C 500 mg

◦ Olej z wątroby dorsza 500 mg, w tym kwasy omega-3:

- Kwas eikozapentaenowy (EPA) 35 mg
- Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 45 mg

◦ Witamina D (D3) 2,75 µg (110 j.m.)

◦ Witamina A360 µg

* RWS - referencyjna wartość spożycia.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych do stosowania w okresie narażenia odporności organizmu (okres jesienno-zimowy), zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (stres, palenie papierosów, osoby starsze), wysokiej aktywności fizycznej, a także dla osób chcących wzbogacić swoją dietę w wysokiej jakości tran.

Dawkowanie

1 kapsułka raz dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Osoby z zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), stosujące leki, w szczególności przeciwzakrzepowe lub obniżające ciśnienie krwi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz osoby z niedociśnieniem, stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować innych suplementów diety zawierających witaminę C (w szczególności w ilościach powyżej 500 mg).