

Opokan 7,5mg x30 tabletek

Cena: 18,77 PLN



Opis słownikowy

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Opakowanie | 30 tabletek |
| Podmiot odpowiedzialny | Aflofarm |
| Postać | tabletki |
| Substancja czynna | meloksykam |
| Typ produktu | produkt leczniczy |
| Wiek | dorośli, dzieci, od 15 roku życia |

Opis produktu

Wskazania:

Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych, w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.

W krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz zeszywniające zapalenie kręgosłupa.

Dawkowanie:

1 tabletkę na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.

Przeciwwskazania:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników leku, - jeśli u pacjentów występuje nadwrażliwość na inny lek należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) np. kwas acetylosalicylowy, - jeśli podczas podawania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) wystąpiły napady duszności bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy, - jeśli u pacjentów występuje ciężka niewydolność wątroby, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i pacjent nie jest leczony dializami, - jeśli u pacjenta występuje czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, - jeśli kiedykolwiek wystąpił wylew krwi do mózgu lub inne krwawienia np. z przewodu pokarmowego, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, - w okresie ciąży (III trymestr) i podczas karmienia piersią, - u dzieci poniżej 15 lat.

Skład:

1 tabletkę zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum) oraz substancje pomocnicze: w tym laktozę jednowodną.