

# Opokan Actigel 100mg/g żel 50g

Cena: 9,34 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	50g
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	żel
Substancja czynna	naproksen
Typ produktu	produkt leczniczy

## Opis produktu

Opokan Actigel, żel o działaniu miejscowym, zawierający substancję czynną naproksen, która ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

## Dlaczego Opokan Actigel

- Żel o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.
- Opokan Actigel to naproksen w formie żelu.
- Jedyne (1) taki lek zawierający DMSO, substancję, zwiększającą wchłanianie (2), szybko przynoszący ulgę w bólu.
- Stosowany w bólach pourazowych mięśni i stawów, bólach w chorobie zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

(1) Wśród produktów leczniczych OTC do stosowania zewnętrznego zawierających jako substancję czynną naproksen.

(2) Nie można wykluczyć, iż wchłanianie naproksenu po zastosowaniu produktu leczniczego będzie większe niż po stosowaniu innych leków zawierających naproksen o takim samym stężeniu i postaci farmaceutycznej, ale nie zawierających w swoim składzie DMSO.

## Wskazania do stosowania

Bóle pourazowe mięśni i stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia), bóle kręgosłupa, bóle w chorobie zwyrodnieniowej stawów i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

## Do stosowania w leczeniu:

- Bólów pourazowych mięśni i stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia), bólów kręgosłupa,

- Bólów w chorobie zwyrodnieniowej stawów,
- W reumatoidalnym zapaleniu stawów.

#### **Skład:**

1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum) w postaci naproksenu sodowego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

#### **Sposób użycia:**

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Niewielką ilość żelu (około 5 cm wyciśniętego paska) należy nakładać na bolące miejsca 4 do 5 razy na dobę, delikatnie wcierając aż do całkowitego wchłonięcia żelu. Maksymalna dawka dobową naproksenu podawana miejscowo wynosi 500 mg (około 25 cm wyciśniętego paska żelu). 5 cm wyciśniętego paska żelu zawiera średnio 100 mg naproksenu. Żel należy nakładać na oczyszczoną suchą skórę. Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.