

Panadol Extra x24 tabletki



Cena: 21,55 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	24 tabletki
Podmiot odpowiedzialny	Haleon
Postać	tabletki
Substancja czynna	paracetamol, kofeina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

OPIS DZIAŁANIA

Preparat Panadol Extra zawiera w swoim składzie paracetamol - substancję o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz kofeinę nasilającą działanie przeciwbólowe. Paracetamol nie powoduje podrażnienia żołądka. Paracetamol nie działa przeciwzapalnie.

WSKAZANIA

Paracetamol działa przeciwbólowo w:

- bólach głowy,
- gardła,
- migrenach,
- bólach zębów,
- bólach kostnych, stawowych i mięśniowych
- bólach menstruacyjnych.

Preparat Panadol Extra może być stosowany w:

- przeziębieniach
- stanach grypopodobnych

Działa przeciwgorączkowo.

PRZECIWWSKAZANIA

- Nie należy stosować preparatu Panadol Extra u osób z nadwrażliwością na paracetamol lub kofeinę.
- Nie wolno przyjmować preparatu Panadol Extra łącznie z innymi lekami zawierającymi w swoim składzie paracetamol.
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, choroba alkoholowa, pierwszy trymestr ciąży, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, bezsenność.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA SPECJALNE

Należy unikać stosowania preparatu Panadol Extra u alkoholików, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek; szczególnie zagrożeni są chorzy głodzeni; w czasie stosowania leku nie wolno spożywać żadnych napojów alkoholowych. Duża ilość wypitej kawy czy herbaty przy jednoczesnym przyjmowaniu tego leku może spowodować uczucie napięcia i rozdrażnienia.

Okres ciąży i karmienia piersią

- stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

INTERAKCJE

- paracetamol nasila działanie doustnych środków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny,
- łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek,
- salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu,
- rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne stosowane łącznie z paracetamolem nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby,
- doustne leki antykoncepcyjne, cimetydyna zmniejszają metabolizm kofeiny, natomiast barbiturany i palenie tytoniu przyspieszają,
- paracetamol stosowany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę,
- metoklopramid przyspiesza a wszystkie cholinolityki opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego,
- paracetamol nasila ośrodkowe działanie kofeiny,
- kofeina jest antagonistą leków nasennych i przeciwpadaczkowych.

DAWKOWANIE

Dorośli i dzieci od 12 roku życia: W zależności od nasilenia dolegliwości 1 do 2 tabletki preparatu Panadol Extra co 4 godziny. Preparatu Panadol Extra nie należy przyjmować częściej niż co 4 godziny.

Nie wolno przekraczać 4 dawek (8 tabletek) w ciągu doby.
Preparat nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Jeśli objawy choroby nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE

Jeśli przekroczona została zalecana dawka leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Objawy przedawkowania z reguły ujawniają się po dwóch godzinach. Są to bolesność w okolicy wątroby, po dwóch dniach żółtaczka. Czasami wcześniej pojawiają się nudności i wymioty. Kofeina może powodować niemiarowość rytmu serca, drgawki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane paracetamolu są rzadkie.
Mogą wystąpić:

- skórne odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień
- zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty,
- sporadycznie może wystąpić: trombocytopenia, methemoglobinemia, agranulocytoza,
- przy przedawkowaniu upośledzenie czynności wątroby oraz nerek,
- ze względu na obecność kofeiny: zaburzenia snu, bóle głowy, drżenia mięśniowe, niemiaryowość rytmu serca.

SKŁAD

Każda tabletkę preparatu Panadol Extra, przeznaczona do podawania doustnego zawiera:

- paracetamol - 500 mg;
- kofeina - 65 mg