

Permen Med Forte 50mg x4 tabletki

Cena: 24,00 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	4 tabletki
Podmiot odpowiedzialny	Stada
Postać	tabletki
Substancja czynna	syldenafil
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Lek Permen Med Forte, 50 mg, tabletki powlekane zawiera syldenafil i jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Permen Med Forte pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Leku Permen Med Forte nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

W jaki sposób dochodzi do wzrodu

Erekcja (wzwód prącia) jest złożonym procesem wymagającym współdziałania układu nerwowego, naczyniowego i hormonalnego. Ten proces nie może zajść bez odpowiedniej stymulacji seksualnej.

Ciała jamiste, z których zbudowany jest członek, w czasie pobudzenia seksualnego zostają silnie wypełnione krwią. Powstały w ten sposób wzrost ciśnienia krwi prowadzi do erekcji (wzrodu) – usztywnienia umożliwiającego odbycie stosunku płciowego. Wzwód jest możliwy do osiągnięcia tylko wtedy, gdy układ nerwowy i naczyniowy działają prawidłowo. Zapewnia to właściwe reagowanie na bodźce seksualne oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do członka.

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji (dawniej i/lub potocznie: impotencja) mają miejsce wtedy, gdy mężczyzna przez dłuższy czas nie jest w stanie uzyskać lub utrzymać wzrodu w taki sposób, by odbyć satysfakcjonujący stosunek płciowy. Wynikają one ze zmniejszonego napływu krwi do ciał jamistych prącia.

Bardzo często zaburzenia erekcji są następstwem uszkodzenia naczyń doprowadzających krew do prącia.

Zaburzenia erekcji mogą być pierwszym zwiastunem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca, która może prowadzić do zawału. Otyłość, ograniczona aktywność fizyczna i nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz związana z nimi cukrzyca należą do najczęstszych przyczyn uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Do pozostałych czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń erekcji zalicza się: zaawansowany wiek, siedzący tryb życia, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, przyjmowanie niektórych leków, stosowanie używek (papierosy, alkohol), zaburzenia depresyjne.

Leczenie zaburzeń erekcji

Leczenie zaburzeń erekcji obejmuje następujące elementy:

- zmiana stylu życia, np. rezygnacja z palenia papierosów, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja masy ciała, zmiana diety,
- diagnoza i leczenie chorób, których przyczyną mogą być problemy z erekcją,
- dobranie leczenia innych chorób tak, aby nie przyczyniało się do występowania problemów z erekcją (np. w wyniku działań niepożądanych niektórych leków),
- stosowanie leków wpływających na poprawę erekcji.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- syldenafil (w postaci syldenafilu cytrynianu) 50 mg,

Dawkowanie

Zalecana dawka – 50 mg (1 tabletkę):

- jeżeli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej,
- jeżeli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzrodu wystarczającego do odbycia stosunku).

Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować leku w dawce 50 mg.

Lek Permen Med Forte powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połączyć w całości, popijając szklanką wody.

- Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę.
- Nie należy zażywać większej ilości tabletek, niż wskazano w ulotce dla pacjenta.
- Lek umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku - Permen Med Forte jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
- Nie należy przyjmować leku Permen Med Forte razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku Permen Med Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. - Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Permen Med Forte nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzrodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek, niż zalecono. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.