

Pluscard 100mg+ 40mg x60 tabletek



Cena: 11,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	60 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	tabletki
Substancja czynna	glicyna, kwas acetylosalicylowy
Typ produktu	produkt leczniczy

Opis produktu

Pluscard – zapobiega zawałowi serca

Pluscard to lek, w skład którego wchodzi kwas acetylosalicylowy i glicyna.

Pluscard hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi i jest wskazany do profilaktycznego stosowania w chorobach groźących powstawaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Tylko Pluscard, oprócz tego, że zabezpiecza przed zawałem serca, zawiera dodatkowo glicynę, która chroni żołądek i cały układ pokarmowy przed podrażnieniem przez kwas acetylosalicylowy.

Dlaczego?

Jedynе połączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce kardiologicznej z glicyną

Kwas acetylosalicylowy (ASA)

- Zabezpiecza przed zawałem, ale może podrażniać śluzówkę żołądka i przewodu pokarmowego

Glicyna

- Chroni przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem ASA

PLUS DLA SERCA

KWAS ACETYLOSALICYLOWY

- Jedna z najlepiej przebadanych substancji leczniczych na świecie
- Podstawa leczenia powikłań chorób sercowo-naczyniowych¹
- Hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi
- Stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstawaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych powodujących zawał serca, czy udar mózgu²

PLUS DLA ŻOŁĄDKA

GLICYNA

- Aminokwas endogenny, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
- Pomaga odbudowywać tkankę przewodu pokarmowego
- Wykazuje działanie ochronne na błonę śluzową żołądka oraz dalsze odcinki przewodu pokarmowego
- Zmniejsza ryzyko podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego przez kwas acetylosalicylowy, co może zapobiec wystąpieniu schorzeń takich jak choroba wrzodowa²

Kiedy?

Stosuje się w sytuacjach, w których celowe jest hamowanie agregacji (zlepianie) płytek krwi²:

- zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową
- w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca
- zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebyłym zawałe mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej

Jak?

Dawkowanie²:

	zwykle 1 tabletkę na dobę
Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebyłym zawałe mięśnia sercowego	zwykle 1 tabletkę na dobę
Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytych zabiegach na naczyniach wieńcowych	zwykle 2 tabletki na dobę
	zwykle 1 tabletkę na dobę
W świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca	jednorazowo 3 tabletki – należy je dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie

- tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku popijając wodą
- w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 3 tabletki - należy je dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie

- decyzję o rozpoczęciu leczenia produktem Pluscard powinien podjąć lekarz

Skład:

1 tabletkę zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 40 mg glicyny (Glycinum).

Wskazania do stosowania:

Stosuje się w sytuacjach, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową; w świeżym zawał serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytych zawałach mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej.

¹Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku, *Kardiologia Polska* 2016; 74, 9: 821–936.

²Charakterystyka Produktu leczniczego Pluscard.