

Polopiryna Max 500mg x20 tabletek

Cena: 17,40 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	kwas acetylosalicylowy
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 16 roku życia

Opis produktu

WSKAZANIA

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza).

SKŁAD I POSTAĆ

Każda tabletką zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

DAWKOWANIE

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwykle stosuje się:

- Dorośli: jednorazowo od 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek). W razie potrzeby dawkę można powtarzać 2 lub 3 razy na dobę.
- Nie należy przyjmować więcej niż 3 g na dobę.
- Młodzież w wieku powyżej 16 lat, wyłącznie na zlecenie lekarza: 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) na dobę.
- Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.
- Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można stosować nie dłużej niż 3 dni.

W chorobach reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza, najczęściej stosuje się:

- w gorączce reumatycznej: 1000 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę;
- w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 500 mg (1 tabletkę) 3 lub 4 razy na dobę.