

# Pronasal Control 50µg/dawkę aerozol do nosa x60 dawek



Cena: 27,67 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	60 dawek
Podmiot odpowiedzialny	Teva
Postać	aerozol
Substancja czynna	mometazon
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

## Opis produktu

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Produkt leczniczy Pronasal Control wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza.

### DAWKOWANIE:

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

- zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobową: 200 mikrogramów).
- Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobową: 100 mikrogramów); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.
- U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania produktu leczniczego Pronasal Control występował w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnego działania produktu leczniczego.
- Warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.
- U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami alergicznego sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa w wywiadzie, konieczne może być rozpoczęcie leczenia produktem leczniczym Pronasal Control na kilka dni przed spodziewanym początkiem okresu pylenia.
- W przypadku braku poprawy objawów po upływie 14 dni stosowania, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.
- Lek Pronasal Control nie powinien być stosowany dłużej niż przez 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.

#### Dzieci i młodzież

- Pronasal Control nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

#### SPOSÓB PODAWANIA:

- Przed podaniem pierwszej dawki należy wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (aby uzyskać jednolity aerozol).
- Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw odpowietrzyć pompkę poprzez dwukrotne naciśnięcie do uzyskania jednolitego aerozolu.
- Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem.
- Po zużyciu produktu leczniczego według oznakowania lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, opakowanie należy wyrzucić.
- Końcówka dozownika powinna być skierowana w stronę nozdrza a nie w kierunku przegrody nosowej.

#### PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na substancję czynną mometazonu furoinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Pronasal Control nie należy stosować w przypadku obecności nieleczonych miejscowych zakażeń obejmujących błonę śluzową nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal Control u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.

#### SKŁAD:

Pronasal Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Każde naciśnięcie pompki (0,1 ml) dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Całkowita masa jednej dawki wynosi 100 mg.