

Radirex MAX x10 kapsułek



Cena: 12,10 PLN

Opis słownikowy

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Opakowanie | 10 kapsułek |
| Podmiot odpowiedzialny | Herbapol Wrocław |
| Postać | kapsułki |
| Substancja czynna | rzewień |
| Typ produktu | produkt leczniczy |
| Wiek | dorośli, dzieci, od 12 roku życia |

Opis produktu

Co wyróżnia Radirex Max?

Radirex Max to nowoczesny lek przeczyszczający, opracowany zgodnie z najnowszymi zaleceniami europejskimi w zakresie fitoterapii zaparć, w skład którego wchodzi wyciąg z korzenia rzewienia, znany od lat środek stosowany w leczeniu zaparć¹.

Głównymi składnikami czynnymi preparatu Radirex Max, które odpowiadają za działanie przeczyszczające są antrachinony (pochodne hydroksyantracenowe) zawarte w wyciągu z korzenia rzewienia.

W jelicie grubym z antrachinonów powstają antrony i antranole, które wykazują działanie stymulujące na błonę śluzową i mięśnie gładkie jelita.

Dzięki zastosowaniu korzenia rzewienia, Radirex Max wpływa na częstość wypróżnień w dwojaki sposób²:

- Nasila skurcze perystaltyczne mięśni gładkich jelit
- Rozluźnia masy kałowe poprzez zwiększenie wydzielenia wody i elektrolitów do wnętrza jelita grubego

Radirex Max zawiera bardziej skoncentrowaną substancję czynną (w porównaniu do preparatu Radirex), dzięki czemu maksymalną dawkę dobową przyjmuje się w postaci 2, a nie 3 pojedynczych dawek leku.

Radirex jest naturalnym preparatem roślinnym, zawierającym w swoim składzie korzeń rzewienia, wykazujący właściwości przeczyszczające. Zalecany jest do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.

Jak stosować lek Radirex MAX

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 2 kapsułki Radirex MAX na dobę, wieczorem.
- Pacjenci, u których działanie jest zbyt silne, mogą obniżyć dawkę i stosować 1 kapsułkę na dobę, wieczorem.
- Najodpowiedniejszą dawką jednorazową jest najniższa dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.
- Działanie przeczyszczające następuje po 8 – 12 godzinach.
- Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.
- Maksymalną dawką dobową jest 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych.
- Odpowiada to dwóm kapsułkom Radirex MAX.
- Zazwyczaj wystarcza stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.
- Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci poniżej 12 lat: nie stosować.

Skład

1 kapsułka twarda zawiera 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z korzenia rzewienia (*Rheum palmatum L.* i/lub *Rheum officinale Baillon, radix*), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę.

¹ EMEA: *Community Herbal Monograph on Rheum Palmatum L. and Rheum officinale baillon, radix*, European Medicines Agency, London, 2007

² ChPL *Radirex Max*