

Rutinoscorbin x210 tabletek

Cena: 26,06 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	210 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Haleon
Postać	tabletki
Substancja czynna	rutyna, witamina C
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Rutinoscorbin jest lekiem złożonym o skojarzonym działaniu rutyny i witaminy C. Rutyna uszczelnia naczynia włosowate, zapobiega krwawieniom, wybroczynom i żylakom. Dzięki właściwościom przeciwutleniacza rutyna chroni witaminę C nasilając jej działanie. Witamina C jest związkem niezbędnym w wielu procesach metabolicznych, wspomaga układ odpornościowy, uczestniczy w procesach usuwania wolnych rodników.

Wskazania:

W stanach niedoboru witaminy C i rutyny. Wspomaganie odporności organizmu. Uszczelnianie naczyń włosowatych. Zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia:

Nie stosować jednocześnie z sulfonamidami. Witamina C, w dużych dawkach, jest przeciwwskazana u osób z nadmiernym wydalaniem kwasu szczawiowego, dną, kamicą moczanową, cystynurią, w stanach hipokaliemii i hiperkalcemii.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Przed zastosowaniem u kobiet ciężarnych i karmiących należy zasięgnąć porady

lekarza.

Interakcje:

Rutinascorbin może zmniejszać skuteczność sulfonamidów i antybiotyków aminoglikozydowych. Rutyny, podawanej dłużej niż 4 tygodnie, nie należy stosować jednocześnie z glikozydami nasercowymi, lekami obniżającymi ciśnienie krwi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, bowiem nasila ich działanie. Witamina C nasila działanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych, zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, wydłuża okres półtrwania paracetamolu.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania wysokich dawek witaminy C (powyżej 600 mg na dobę) mogą wystąpić: wymioty lub nudności, ból głowy, zaczerwienienie, zwiększone oddawanie moczu. W dawkach powyżej 1 g witaminy C na dobę mogą wystąpić: biegunka i kamica nerkowa.

Dawkowanie:

Profilaktycznie:

- 1 do 2 tabletek na dobę.

W stanach niedoboru witaminy C:

- 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

U dzieci poniżej 6 roku życia:

- stosować według wskazań lekarza.

Skład:

1 tabletkę zawiera substancje czynne: Rutyna 25 mg, Kwas L-askorbowy (witamina C) 100 mg Substancje pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Hydroksypropylometyloceluloza, polietylenoglikol 6000, tytanu dwutlenek, talk, żółcień chinolinowa (E 104).