

Scorbolamid Extra Hot x8 saszetek

Cena: 16,14 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	8 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Substancja czynna	cynk, rutyna, salicylamid, witamina C
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 16 roku życia

Opis produktu

Scorbolamid Extra Hot to lek w saszetkach o smaku cytrynowym, który dzięki swojej kompozycji i formie działa:

- Przeciwbólowo
- Przeciwgorączkowo
- Przeciwzapalnie
- Rozgrzewająco

Skład:

Salicylamidum + Acidum ascorbicum+ Rutosidum+ Zincum (300 mg + 300 mg + 50 mg + 5 mg)/saszetkę, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.

SALICYLAMID¹

- Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

KWAS ASKORBOWY¹

- Uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.

RUTOZYD¹

- Wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.

CYNK^{1 2}

- Wspomaga działanie układu odpornościowego oraz wykazuje właściwości przeciwutleniające, dzięki którym neutralizuje wolne rodniki.

Wskazania:

Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na salicylamid lub inne składniki leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy);
- czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego;
- zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);
- zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego);
- kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego);
- hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
- ciężka niewydolność serca;
- jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych;
- ciąża;
- karmienie piersią;

Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

Dawkowanie i sposób podawania:

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę. Wysypać zawartość jednej saszetki produktu Scrobolamid EXTRA HOT do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatu.
- Uwaga: granulatu nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu.
- Produkt leczniczy przyjmować po posiłku.
- Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej należy prowadzić najkrócej jak to możliwe.
- Jeżeli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasilą się (nawet przed upływem tego czasu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

¹ ChPL produktu Scrobolamid EXTRA Hot

² Mońka I, Wiechuła D. Znaczenie cynku dla organizmu ludzkiego w aspekcie suplementacji tego pierwiastka. *Ann. Acad. Med. Siles. (online)* 2017; 71: 314–325.