APTE.PL A.T.HINZ S.J.
ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

Sebidin Plus x16 tabletek do ssania

Cena: 9,07 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	16 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Perrigo
Postać	tabletki do ssania
Substancja czynna	chlorheksydyna, witamina C
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

OPIS DZIAŁANIA

Wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków Candida albicans.
Witamina C zmniejsza stan zapalny i obrzęk śluzówki jamy ustnej i gardła, nasila mechanizmy obronne, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Zapalenie błony śluzowej gardła.
- Zapobieganie i leczenie zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia.
- Zapalenia błony śluzowej jamy ustnej o charakterze nieżytowym.
- Afty przewlekle nawracające, pleśniawki, nadżerki i odleżyny będące np. następstwem stosowania przez pacjentów źle dopasowanych uzupełnień protetycznych.
- Odkażanie jamy ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych.

PRZECIWWSKAZANIA

- Odczyn alergiczny na chlorheksydynę lub inne składniki preparatu.
- Ze względu na zawartość aspartamu preparatu nie należy stosować u osób z fenyloketonurią.

OSTRZEŻENIA I ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Stosowanie leku może zaburzać odczuwanie smaku, które zwykle ustępuje po 4 godzinach od zastosowania. Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

Nie zaleca się stosować dłużej niż 14 dni.

- Przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić zmiana odcienia barwy zębów oraz grzbietu języka, które mogą ustąpić samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.
- U pojedynczych chorych (cierpiących na choroby przewodu pokarmowego i wątroby) mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy przerwać pobieranie leku.
- Rzadko występują wysypki na skórze oraz powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej i obrzęk ślinianek przyusznych.

STOSOWANIE LEKU PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ

Zaleca się, aby kobiety w ciąży i matki karmiące stosowały preparat po skonsultowaniu się z lekarzem.

ODDZIAŁYWANIE Z INNYMI LEKAMI (INTERAKCJE)

Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

- Dorośli i młodzież (12-17 lat):
    - ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).
- Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.
- Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.
- Przez 2 godz. po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej objętość płynów.

SKŁAD

- Chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg
- Kwas askorbowy (witamina C) 75 mg