APTE.PL A.T.HINZ S.J.
ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

Sebidin x20 tabletek do ssania

Cena: 15,34 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Perrigo
Postać	tabletki do ssania
Substancja czynna	chlorheksydyna, witamina C
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

CO TO JEST SEBIDIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sebidin, tabletki do ssania jest lekiem o skojarzonym działaniu dichlorowodorku chlorheksydyny i witaminy C.

- Dichlorowodorek chlorheksydyny wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków Candida albicans.
- Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.
- Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na kwas askorbowy występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.

Wskazania do stosowania leku Sebidin:

Miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

Ciąża

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ogranicza zdolności psychomotorycznych, nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

JAK STOSOWAĆ SEBIDIN

Dorośli i dzieci od 12 lat:

- ssać po 1 tabletce 4 razy na dobę (co 6 godzin).
- Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do próchnicy.
- Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.
- Przez 2 godz. po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej objętości płynów.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

SKŁAD

1 tabletka zawiera substancje czynne:

- chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg
- kwas L-askorbowy (witamina C) 50 mg