

Septolete Ultra o smaku eukaliptusowym x16 pastylek do ssania

Cena: 19,01 PLN



Opis słownikowy

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Opakowanie | 16 pastylek |
| Podmiot odpowiedzialny | Krka |
| Postać | pastylki do ssania |
| Substancja czynna | benzydamina, cetylpirydyna |
| Typ produktu | produkt leczniczy |
| Wiek | dorośli, dzieci, od 6 roku życia |

Opis produktu

Pastylki do ssania Septolete Ultra to produkt leczniczy stosowany miejscowo przy podrażnieniach gardła o różnej etiologii. Jest to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i antyseptycznym. Substancje czynne w preparacie to chlorowodrek benzydminy i chlorek cetylpirydyniowy. Stosowanie pastylek działa dezynfekująco na jamę ustną i gardło. Septolete Ultra zmniejsza objawy zapalenia gardła, krtani, dziąseł – ból, obrzęk i zaczerwienienie.

Zastosowanie:

Septolete Ultra przeznaczony do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i antyseptyczny w leczeniu podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł oraz zapaleniu gardła i krtani.

Informacje dodatkowe:

Nie można stosować Septolete Ultra w połączeniu ze związkami anionowymi, które zawarte są w paście do zębów, dlatego nie zaleca się zażywać produktu bezpośrednio przed myciem zębów lub po ich czyszczeniu. Pastylki przyjmować na godzinę przed jedzeniem lub godzinę po posiłku. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie ciąży. Ze względu na zawartość izomaltu osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny przyjmować leku.

Dawkowanie:

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: zaleca się powoli ssać jedną pastylkę co 3 do 6 godzin (3-4 pastylki dziennie).
- Dzieci od 6. do 12. roku życia: ssać jedną pastylkę co 3 do 6 godzin (maksymalnie 3 pastylki dziennie). Nie należy przekraczać rekomendowanej dawki.

Nie stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po 3 dniach stosowania objawy nie miną lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości, pieczenie lub suchość w jamie ustnej, niedoczulica jamy ustnej, skurcz oskrzeli, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, uczucie pieczenia jamy ustnej, pokrzywka, nadwrażliwość na światło.

Skład:

Substancje czynne w jednej pastylce: chlorowodorek benzydamininy – 3mg, chlorek cetylpirydyniowy – 1mg. Substancje pomocnicze: olejki eukaliptusowy, lewomentol, kwas cytrynowy bezwodny (E 330), sukraloza (E 995), izomalt (E 953), błękit brylantowy FCF (E 133).