

## SeptOral MED żel stomatologiczny 20ml

Cena: 20,58 PLN



### Opis słownikowy

Miejsce stosowania	jama ustna, zęby
Opakowanie	20ml
Podmiot odpowiedzialny	Avec Pharma
Postać	żel
Substancja czynna	chlorheksydyna, cytrynian trójsodowy, kwas hialuronowy (hialuronian sodu), mleczan glinu
Typ produktu	kosmetyk
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

### Opis produktu

SeptOral MED to żel stomatologiczny, który dzięki połączeniu składników aktywnych, dwuglukonianu chlorheksydyny, mleczanu glinu oraz kwasu hialuronowego, zapewnia skuteczną ochronę dziąseł i błon śluzowych, redukuje krwawienie dziąseł, koi stany zapalne, afty, pleśniawki, itp. Żel wspomaga naturalny proces gojenia śluzówki, zmniejsza dyskomfort, przyspiesza czas regeneracji uszkodzonych tkanek.

### Dobroczynne działanie składników aktywnych żelu SeptOral MED:

- łagodzą podrażnienia dziąseł i błon śluzowych,
- hamują krwawienie dziąseł,
- działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo,
- wspomagają regenerację dziąseł i błon śluzowych,
- przyspieszają gojenie aft, nadżerek, owrzodzeń oraz urazów od protez czy aparatów ortodontycznych.
- zmniejszają nadwrażliwość zębów.

### Składniki aktywne żelu SeptOral MED:

- **Chlorheksydyna** - najbardziej znany środek o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Skutecznie redukuje ilość drobnoustroji rozwijających się w przyzębiu, które odpowiedzialne są za stany zapalne i krwawienia dziąseł. Regularnie stosowana Wspomaga usuwanie płytki nazębnej i opóźnia jej ponowne gromadzenie. Działanie płynu utrzymuje się do kilku godzin.
- **Kwas hialuronowy** - aktywny element regeneracji tkanek, bierze udział w naturalnych procesach utrzymania zdrowego stanu

błony śluzowej i dziąseł, przyspiesza tworzenie tkanki dziąsłowej.

- **Mleczan glinu** - posiada właściwości ściągające i przeciwzapalne, przyspiesza gojenie błon śluzowych, zmniejsza krwawienie i chroni zęby przed tworzeniem się kamienia nazębnego.
- **Cytrynian trójsodowy** - łagodzi wrażliwość zębów przez zahamowanie przewodzenia bodźców bólowych nerwów czuciowych miazgi zęba.

### Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu SeptOral MED należy nanieść bezpośrednio na chorobowo zmienione miejsce, przy pomocy czystego palca lub wacika. Żel należy wcierać przez ok. 2 minuty wykonując lekkie ruchy masujące. Po nałożeniu żelu nie należy płukać ust oraz nie spożywać pokarmów przez ok. 20 minut. Stosować 2-3 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.